



Дикая природа
**ЗВЁЗДНЫХ
ВОИН**

Практическое руководство

Авторы
Терри Уитлэтч и Боб Карроу

Сравнение размеров животных



Дикая природа
**ЗВЁЗДНЫХ
ВОИН**






Дикая природа ЗВЁЗДНЫХ ВОИН

Практическое руководство

Авторы Терри Уитлэтч и Боб Карроу

Chronicle Books
SAN FRANCISCO



Прежде всего, хотелось бы поблагодарить моего мужа, Тома Уитлэтча. Также выражаю огромную признательность Тине Миллс, Бену Харперу, Иэну Моррису и Люси Уилсон из Lucasfilm; а также Дагу Чангу, Vis-a-Vis, Inc., и Дэвиду Крэйгу, Дженни Крейк, Джо Дональдсону, Черил Эвардс, Стефани Лостимоло, Джейн Мейсон и Дереку Смиту. Особая благодарность Джорджу Лукасу, за то, что позволил мне поиграть в его вселенной.

-Т.У.

Посвящается живой природе, где бы она ни находилась, и, конечно же, Джорджу Лукасу, придумавшему мир, в котором ей тоже нашлось место.

-Б.К.

Copyright © 2001 Lucasfilm Ltd. and ® or ™ where indicated. All rights reserved. Used under authorization.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data available.

ISBN 0-8118-2869-7

Printed in Hong Kong

Distributed in Canada by Raincoast Books

9050 Shaughnessy Street

Vancouver, British Columbia V6P 6E5

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Chronicle Books LLC

85 Second Street

San Francisco, California 94105

www.chroniclebooks.com

Lucas Licensing Editor: Ben Harper

Lucas Licensing Art Director: Iain Morris

Chronicle Books Editor: Sarah Malarkey

Chronicle Books Editorial Assistant: Anne Bunn

Chronicle Books Art Director: Pamela Geismar

Chronicle Books Production: Tera Killip

Original calligraphy: Tim Hanrahan

Type design and layout: Peter Kesselman

Dewback skin: Kim Smith

www.starwars.com

Оформление и перевод русского издания - команда «Википедии»:

Перевод - Kestrel

Редакция - Sightsaber и Голограмма Ханга

Верстка - ARC delta 08

Оглавление

Предисловие	Стр. 6
Татуин	Стр. 8
Хот	Стр. 44
Дагоба	Стр. 54
Набу: Тид и окрестности	Стр. 66
Набу: Океанская бездна	Стр. 82
Набу: Гунганские болота	Стр. 92
Беспин	Стр. 132
Эндор	Стр. 138
Явин-4	Стр. 146
Корусант	Стр. 152
Алфавитный указатель	Стр. 174



Предисловие

В огромной, многоликой Галактике живёт множество различных рас: неймодианцы, хатты, эвоки, чадра-фаны, иторианцы; список этот бесконечен и поражает многообразием. Ионные журналы и Голонет полнятся историями о подвигах и катастрофах тех, кто вписал себя в мифологию наших времён. Цивилизации переживают взлёты и падения; героев возносят на престол, а тиранов проклинают. Но как

насчёт других существ? Существ, живущих рядом с нами? Существ, которые по своей неспособности говорить или по природному отсутствию амбиций не обязательно оставляют свой след в истории?

Удивительные и невероятные факты о жизни и поведении этих животных призвана запечатлеть данная работа. Перед вами справочник-определитель, в котором отображена лишь малая часть тех необыкновенных организмов, которые населяют различные экосистемы и экологические ниши нашей вселенной. Его главная цель — определить и объяснить способы питания, брачные повадки, стадные инстинкты и защитные механизмы этих невероятных существ.

Как и полевые дневники, на основании которых была составлена эта книга, справочник поделён на разделы, посвящённые разным планетам. Краткое вступление даёт общую характеристику каждой из планет и описание её основной экосистемы — жаркой, ледяной, газообразной и т.д. Затем мы сразу же переходим к описанию самих биологических видов, к каждому из которых прилагаются иллюстрации, выполненные пером и тушью, и краткие заметки на полях.



При помощи этих нехитрых приспособлений художник попытался передать зачастую захватывающую дух задачу сделать живую природу ближе. И хотя читатель не сможет услышать сам громоподобный топот вспугнутого стада бант или почувствовать смрадное дыхание ревущего фалумпасета, тем не менее он получит возможность узнать немного больше о жизни этих существ в их естественной среде обитания.

Потребовались многие годы полевых исследований и наблюдений, чтобы собрать эти записи. Немало опасностей подстерегало при попытках найти и изучить всех этих существ в их порой весьма опасных природных местах обитания. Зарисовки делались на ходу, в укрытиях, в то время как животные паслись вокруг автора, мчались в панике, приносили потомство или дрались друг с другом. Хотя иллюстраций для данного справочника почищены и приведены в порядок, исходные записи были изрядно потрёпаны, заляпаны землёй, забрызганы дождём, каплями крови и слюны. Эти записки никогда не были бы опубликованы, если бы автор не проявил неустранимый дух современного исследователя.

Наша вселенная поистине удивительна. Этот справочник лишь поможет вам лишний раз убедиться в этом. Мы благодарим Лирре Тенну, нашего полевого зоолога, за её вдохновенные зарисовки и проникательные наблюдения. Мы благодарим всех сотрудников Всегалактического зоологического общества, внесших вклад в этот справочник. И, наконец, мы благодарим тебя, уважаемый читатель, за твою любознательность и интерес к нашему труду.



Татуин



Информация о планете

Ландшафт: пустыни

Расы: люди, джавы, таскены

Язык: общегалактический, бокке, хаттский, джавский, таскенский

Атмосфера: кислородная смесь

Интересные места: космопорт Мос-Эйсли, дворец Джаббы, Мос-Эспа

Татуин расположен в самом отдалённом уголке Внешнего Кольца, в системе Тату, и обладает всеми характерными признаками планеты, иссушаемой сразу двумя солнцами. Как результат, природные условия на Татуине крайне суровы. Сухая, бесплодная почва подвергается постоянному воздействию сильных ветров и испепеляющего зноя. Воды здесь мало, пищи ещё меньше. Удивительно, как в этом негостеприимном месте вообще может существовать жизнь — но, тем не менее, она существует, и даже отличается немалым разнообразием (в особенности крупные виды, нашедшие себе пристанище в песчаных дюнах, ущельях и каньонах). Большинство местных животных облачены в толстые шкуры или панцири — своего рода природную броню, оберегающую их от солнечного зноя и других неблагоприятных условий. У многих видов развились сложные системы внутренней терморегуляции; немалое количество животных могут подолгу обходиться без воды. Многие существа научились уникальным и необычным способам добывать влагу из окружающей среды. Приспособляемость татуинской фауны поражает воображение — и чем дольше исследуешь эту планету, тем больше изумляешься бесконечной изобретательности природы.




Банта

Эти крупные, покрытые длинной шерстью млекопитающие, коренной вид Татуина, обитают здесь во множестве и являются неотъемлемой частью планетарной экосистемы. Некоторые найденные останки бант по возрасту превосходят большинство известных цивилизаций.

Банты — весьма умные и крайне социальные животные. Живут стадами до 25 особей, возглавляемыми вожак-самкой.


Язык банты — очень чувствительный, сильный, подвижный, имеющий сложное строение орган. Он содержит обонятельные железы и служит не только для принятия пищи и питья, но и для хватания и удерживания предметов, а также для сложной коммуникации между животными.



Вожак стада является самая старая, сильная и опытная самка. Она всегда настороже, бдительным глазом (и языком) следит за возможным приближением главных врагов бант — крайг-драконов или ануб, которые нападают на молодняк. Когда вожак стареет, главенство над стадом переходит к следующей подходящей на эту роль кандидатке.

Если стадо слишком разрастается, оно разделяется на два, и вожак-новое становится второй по силе и возрасту самка.

Скетто собирают линяющую шерсть для гнезд.



ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕ:


Продолжительность жизни — 80-100 лет

Вес при рождении — 50 килограмм

Вес взрослой особи — 4000 килограмм

Продолжительность беременности — 30 месяцев

Возраст половой зрелости — 20 лет



Одинокие быки выступают в роли сторожей

самец языком сигнализирует о гоне

самка

самец

30-летняя особь


23-летняя особь

6-летняя особь

Каждый год рога у банты отрастают на один сегмент. По этим сегментам можно определить здоровье животного и окружавшие его в данный период жизни условия: толстые, ребристые участки говорят о достаточном количестве пищи и хорошем состоянии здоровья, в то время как тонкие, потрескавшиеся или малоразвитые участки указывают на голод или нехватку воды. У самцов вырастают более длинные и толстые рога, образуя к концу жизни животного, как правило, два спиралевидных витка. У самок рога на протяжении жизни образуют в среднем лишь один полный виток.

Иногда во время поединка рога бант сцепляются намертво, что для обоих противников означает смерть. В конце концов, они падают от изнеможения, не в силах пошевелиться, пока их полностью не занесёт пустынным песком.

Таскены с благоволением собирают кости бант для каркасов хижин и других целей.



Когда-то банта обыкновенная считалась единственным известным видом банты на Татуине, но затем исследователи обнаружили и другие виды.

Карликовая банта — меньше размером, более робкая и пугливая. Отличается умением преодолевать крутые склоны и обитает среди каньонов и скал отдалённых уголков пустыни.

Дюнная банта — имеет более стройное и поджарое телосложение и менее густую шерсть. Обитает в экваториальных зонах и способна выживать при очень высоких температурах и почти полном отсутствии источников воды.

Кладбища бант этим животным свойственно испытывать странную привязанность к костям своих сородичей. Они складывают их в определённых местах и гладят их языками. Известны случаи, когда самки бант несли своих погибших детёнышей многие километры, чтобы оставить в таком месте. Заходить на кладбища бант считается очень плохой приметой.



карликовая банта



дюнная банта



этапы взросления обыкновенной банты
(*Bantha majorus*)



банты и таскены — таинственный симбиоз



Когда таскенскому ребёнку исполняется семь, ему торжественно дарят телёнка банты того же пола, который должен стать его компаньоном на всю жизнь. Юный таскен заботится о нём, растит и обезджует своего быстро растущего друга.

Когда их банты достигают зрелости, мужчины-таскены осёдывают их и отправляются в пустыню для обрядов инициации и других миссий.



Когда таскен и таскенка женятся, их животные тоже становятся парой, и связь между двумя видами становится ещё крепче. Когда у семьи таскенов рождается сын или дочь, очень часто у их банта появляется детёныш того же пола. Когда банта или таскен умирает, обычно наездник погибшей банты или банта погибшего таскена совершает самоубийство.

древние наскальные рисунки



банта бросается в пропасть после смерти своего наездника




одомашненная ануба

ТАТУИ

Рососпинник

Эти крупные пустынные рептилии получили своё название за способ добычи влаги: ранним утром они слизывают "росу" со спин своих сородичей. Их толстая, шершавая шкура различных оттенков песочного цвета содержит специальный меланин, который защищает животных от солнечных лучей и предотвращает потерю драгоценной влаги.



Рососпинники всеядны: они могут питаться некрупной добычей, а также поедать пустынные растения и растущие под землёй клубни.




Вылизывание спин укрепляет связи между животными.

Рососпинники холоднокровны и ночью становятся неактивными. Чтобы сберечь энергию, они сбиваются на ночь в тесные группы.



Стада рососпинников кочуют неспешным шагом, вереницей один за другим.



Благодаря своим крупным размерам рососпинники почти не имеют естественных врагов. Однако, яйца рососпинников, которые они закапывают в песок, становятся лёгкой добычей для многих хищников, в том числе для гигантских вуду. Рососпинники компенсируют это высокой плодовитостью, откладывая от 50 до 85 яиц в год.

Обычно рососпинники двигаются неторопливо, но в броске могут развивать скорость до 50 км/ч.




главные способы защиты: когти, маскировочная окраска и скорость

Легко одомашниваются, если растить их с момента вылупления.

Ронто

Высокорослые, пугливые млекопитающие, которые обитают в каньонах и на возвышенностях среди татуинских пустынь.


У ронто две пары ушей. Пара более длинных улавливает низкочастотные звуки, а также рассеивает лишнее тепло.



Стада ронто состоят главным образом из самок. Они держатся кольцом, тем самым защищая молодых, находящихся в середине.



Самцы ронто часто устраивают "бои на шеях" — турниры, во время которых ронто колотят друг друга головами, словно молотами, предположительно устанавливая иерархию в стаде.



Длинная шея позволяет ронто дотягиваться до мхов и лишайников на стенах каньонов.

Голова ронто покрыта ороговевшими мозолистыми наростами для защиты от природных явлений и от врагов.



Эопи

Эопи — быстроногие травоядные млекопитающие, способные преодолевать большие расстояния, почти не теряя при этом влагу.

Очень общительны; в природе живут стадами в 20 голов и больше.

Эопи относятся к хоботным: особое суставчатое строение черепа предусматривает длинную и очень гибкую морду и в то же время оставляет достаточно места для острых резцов. Влагу эопи получают в основном из пустынных лишайников и клубней.

Эопи легко приручаются и используются в качестве вьючных животных и в караванах.

плотная шкура покрыта редкой гладкой шерстью

Толстые подушечки на ногах расширяются, касаясь земли, и смягчают бег.

Мозолистые колени для защиты от горячего песка.

Детёныш эопи способен ходить уже через несколько минут после рождения.

Если напугать или разозлить эопи, он может плюнуть в прохожих непереваренным содержимым желудка — малоприятный опыт!

Когда эопи становятся слишком старыми для работы, многие татуинские семьи дарят их своим детям в качестве домашних питомцев, так как в этом возрасте эопи становятся совсем ручными и легко управляемыми.


Галумп

Галумпы — крупные травоядные; несмотря на схожую с рептилиями внешность, на самом деле они являются млекопитающими. Получили своё название за звуки, которые издают, когда ищут корм на рассвете или на закате дня.


Нарост на конце хвоста, заполненный хрящевыми пластинами, начинает раскачиваться, если животное почуяло опасность.

Щелевидные ноздри для защиты от песка.

Сегментированные роговые щитки на спине защищают от хищников и, по-видимому, от потери влаги.



Во время песчаных бурь галумпы зарываются в песок, вдохнуть который не дают узкие ноздри.



При беге галумпы широко открывают рот, наполняя воздухом свои необычайно большие лёгкие. Когда галумп мчитя во весь опор, его лёгкие могут заполнять почти всю полость тела.

Сильные задние ноги придают животному характерный скачущий аллюр, а уникальное строение тела позволяет пересекать пустынные равнины, не сбавляя скорости.

Передние ноги служат для выкапывания корней и любимого лакомства — "пустынных слив". Раздвоенные копыта придают дополнительную ловкость и подвижность.

Ануба



Анубы — хищники и падальщики; нападают на любых существ меньших размеров, а иногда могут завалить и более крупных животных, таких как ронто или Эопи.



Сильные челюсти заканчиваются роговым клыком, способным разгрызть толстые кости.

Анубы весят от 20 до 45 килограмм (самцы несколько крупнее самок)


анубы наблюдают за гонками на подах, дожидаясь разбившихся гонщиков



Анубы живут стаями по 10-12 особей. Каждую стаю возглавляет доминантная пара — самец и самка. Самки приносят 3-4 щенков за сезон и кормят их, отрывая проглоченную добычу.

Длинный хвост служит противовесом при быстром беге и помогает регулировать температуру тела.

Грызая вокруг добычи, анубы пытаются отогнать других пустынных хищников от туши ронто.



Отличаясь ненасытным аппетитом, анубы пожирают добычу до тех пор, пока не теряют способность двигаться.

Вомп-крыса



Эти свирепые, всеядные, очень плодовитые грызуны обычно трусливы, но могут быть опасными, если почувют угрозу. Держатся поодиночке или стаями до 20 особей.




Вомп-крысы пожирают всё подряд, но предпочитают падаль и отходы. Особенно много вомп-крыс обитает на свалках. Популярный вид спорта среди многих жителей Татуина — охота на этих разносящих заразу вредителей.

Джекреб

Очень быстроногие лагоморфы. Питаются растениями: трава и кустарники являются для них источником как корма, так и воды.



Подвижные, похожие на локаторы уши служат не только для слуха, но и для рассеивания лишнего тепла, а также для коммуникации с сородичами.



острое зрение; угол обзора 180 градусов

У самцов шмыгуна закрученные рога; у самок — прямые.

калов для щипания травы



Шмыгун

Шмыгуны — сильные, бегающие на двух ногах грызуны. Путешествуют стаями до 30 особей. Часто держатся вместе с джекребами, а также занимают норы, брошенные профотгами.

Хищники-анубы опасны как для джекребов, так и для шмыгунов.



Вомп-крысы также не прочь полакомиться шмыгунами.

Профогг

Профогги - крупные забавные грызуны, которые роют сложные подземные норы, так называемые "городки". "Городок" профоггов может простирается на несколько гектаров и вмещать от 50 до 100 особей. Каждая часть норы имеет свою функцию, а в заброшенных норах часто селятся другие животные.

Зреющие под землёй семена моло — главный источник пищи для профоггов.

крыла и его личинки

либианы в старой норе профоггов

гнездо с детёнышами

запасы корма

Профогги весят от 10 до 25 килограммов. Рога, рыльца, острые резцы и сильные когти служат для защиты от врагов и для рытья нор. Быстро размножаются — от 6 до 8 раз в год, по 6-8 детёнышей в одном помёте.

шмыгуны воруют запасы

горг в спячке, в за-
твердевшем
коконе из слюны

Вомп-крыса
с пойманным профоггом

Норы профоггов опасны для
всадников.

Урусай

Урусай питаются преимущественно, а то и исключительно одной падалью, иногда объедаясь до такой степени, что не могут взлететь.

У самцов четыре крыла — пара для полёта, и пара меньших для брачного танца. Мощный хвост помогает поддерживать равновесие.

Перьев у урусая нет — вероятно, это имеет гигиеническую функцию: жар солнца уничтожает бактерии на их коже.

ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕ:

Размах крыльев — 2 метра
Длина хвоста — 0,85 метра
Вес — 43 килограмма
Продолжительность жизни — 50 лет

Эти крылатые рептилии неустанно кружат на восходящих потоках воздуха, высматривая туши павших животных.

Когти на крыльях и хвостах помогают цепляться. Урусай гнездятся на скалистых уступах и под крышами башен.

В кладке урусая обычно 2-3 яйца. Птенец, вылупившийся первым, выталкивает остальные яйца из гнезда. Если два птенца вылупились одновременно, они будут драться, пока один не сбросит другого на землю, где тот погибает.

Острое обоняние позволяет урусаям учуять падаль, даже когда они летят высоко над облаками. Урусай играют важную роль в экологии планеты, так как утилизируют трупы, предотвращая распространение заразы.

Вуду

Гигантские наземные рептилии. Питаются в основном яйцами рососпинников и отбирают добычу у ануб.

Двигаются медленно, отличаются огромной силой и мощью.

Весят более 640 килограмм.

Рудиментарные крылья служат для коммуникации с сородичами и рассеивания лишнего тепла.

Короткая шея соединяет непропорционально большую голову с округлым яйцевидным туловищем.

Толстые лапы поддерживают вес тела и позволяют легко преодолевать расстояния.

короткие когти предназначены для копания

Скетто

Летающие рептилии среднего размера с четырьмя крыльями. Живут в пещерах, из которых выбираются на рассвете и на закате, а также на несколько часов по ночам. Питаются летающими насекомыми и пьют кровь у спящих крупных животных.

Глаза имеют большое количество рецепторов "палочек" для сумеречного зрения.

Скетто являются галактической аномалией — теплокровные рептилии, приносящие только одного детеныша за раз.

Рой скетто может досуха выпить кровь у спящего рососпинника. Правда или миф? Требуется дальнейшее изучение.


Зубы предназначены для ловли насекомых и прокусывания толстой шкуры.

ТАТУИН


Уоррт и его добыча

Уоррты — крупные прожорливые амфибии, поедающие всё, что им попадётся. Переваривают добычу с характерным рыгающим звуком.

Уоррты отличаются медленным обменом веществ и редко двигаются.



Уоррты размножаются лишь во время крайне редких дождей, откладывая яйца в лужи. Личинки должны успеть вылупиться и достигнуть взрослой стадии прежде, чем лужа высохнет.



Небольшое обитающее у дорог существо, название не известно. Гибкое, пористое беспозвоночное, которое питается лишайниками и мелкими насекомыми, поджаренными пламенем пролетающего мимо транспорта.

ИБИАНЫ — мелкие амфибии, питающиеся насекомыми и микроскопическими пылевыми клещами.

КРИТЛЫ — насекомые-паразиты, которых можно увидеть в домах и городах. Питаются отходами и растительным перегноем.


ГОРГИ — быстро растущие пустынные амфибии, схожие с уорртами, но меньше размером и более подвижные. Популярная еда на Татуине.


Горговодство

В наши дни горгов разводят на фермах Татуина и готовят из них различные блюда: жарят в листьях манака, засушивают или тушат. На большинстве рынков горгов продают живыми в котлах.

Для разведения коконы горгов помещают в питательную среду, имитирующую лужи, в которых они вылупляются в дикой природе. Затем их кормят бритвомхом, воронкоцветом и даже неочищенными сточными водами. Вскоре горги откладывают яйца, и через пару дней из них появляются головастики. Головастиков необходимо сразу же отсадить, иначе взрослые горги съедят потомство. Когда головастики превратятся во взрослых горгов, их отправляют на рынок.

татуинская фермерша из расы суоков после трудового дня






мясистая чувствительная кожа

нисходящие спирали бритвенно
острых зубов

Сарлакк

Сарлакки — гигантские, весьма редкие и очень долго живущие (в пределах 20-50 тысяч лет) членистоногие, чья главная жизненная функция сводится к перевариванию пищи. Взрослая самка сарлакка зарывается в песок, образуя чудовищный кратер из вечно открытой пасти. Существа, попавшие в пасть, перевариваются живьем и целиком. Точные исследования по понятным причинам невозможны, но полное переваривание, согласно некоторым оценкам, занимает от 500 до 1000 лет.

Иногда анубы загоняют свою добычу к яме сарлакка, чтобы поймать её, пока та будет стараться избежать падения в кратер.



Между сарлакками и урусаями существует определённый симбиоз — урусаяи чистят зубы и щупальца сарлакка, а взамен лакомятся остатками добычи.

Самец сарлакка ведёт паразитический образ жизни, прикрепившись к самке. Известен случай, когда самец-мутант вырос до таких размеров, что через несколько тысячелетий переварил самку.

самец

Пищеварительные соки сарлакка содержат особые кислоты, которые сохраняют добычу живой в течение всего периода переваривания, тем самым поддерживая мясо свежим. Воду сарлакк получает двумя путями: из подземных вод и влаги, содержащейся в добыче.

Споры сарлакка выпускаются через яйцевод, расположенный под кожей. Под землёй они образуют пары из мужской и женской споры, после чего выбираются на поверхность. Споры могут мигрировать через космическое пространство в течение нескольких лет, прежде чем найдут подходящее место обитания. Такие незрелые "бродячие" споры сарлакка довольно уязвимы, и часто погибают от голода или становятся добычей урусаяев.

Большой крайт-дракон (вершина пищевой цепи)

Чудовищного размера рептилия, способная производить огромные разрушения. Встречаются большие крайт-драконы крайне редко. Эти животные ведут одиночный образ жизни; в дневное время они предположительно зарываются в песок. Жилистая мускулатура, массивная туша, мощь и подвижный гибкий скелет делают крайта самым величественным из известных видов рептилий. Ходят слухи, что крайт-драконы способны буквально "плыть" сквозь песчаные дюны.

КАНЬОННЫЙ КРАЙТ-ДРАКОН

Детёныш большого крайта? Вероятнее всего, отдельный вид. Обитают в каньонах, окружающих Дюнное море.

функция роговых отростков неизвестна

Крайт-дракон выкапывает сарлакка — редкая добыча. Обычно они довольствуются бантами.

Гигантское туловище опирается на множество ног.

Считаются яйцекладущими рептилиями; никому, однако, пока не удалось найти яйцо большого крайт-дракона.

Ранкор

Этот редкий вид более типичен для планеты Датомир, где владеющие Силой ведьмы успешно одомашнили их в качестве верховых животных. На Татуине ранкоры встречаются ещё реже; здесь они стали экзотическим завезённым видом.

Бугристая шкура покрыта пульсирующими шишками, бородавками и роговыми наростами.


Ранкоры являются рептомлекопитающими. Они теплокровные, рожают живых детёнышей и заботятся о них, но не выкармливают их молоком.



Рисунки выполнены на основе реконструкций окаменелостей и изображений из Корусантского голографического зоопарка.



Датомирская ведьма приручает подросткового ранкора



Самки ранкоров часто рожают двойню; детёныши цепляются за спину и брюхо матери, которая заботится о них первые три года жизни и делится с ними добычей. Достигнув зрелости, молодые ранкоры покидают семью.



Хищник. Предпочитает крупных травоядных, которых легко поймать, но также ест всё подряд.



Датомирские ведьмы также ездят на чёрных конях, которые, как и они сами, способны менять облик.



ранкор, пойманный в петлю на свиногорызуна-приманку

Хот



Информация о планете


Ландшафт: ледяные равнины

Виды: таунтаун, вампа

Язык: нет

Атмосфера: кислородная смесь

Интересные места: пояс астероидов



Хот — шестая планета в отдалённой, не нанесённой почти ни на одну карту системе с таким же названием, вращающаяся вокруг небольшой и неяркой бело-голубой звезды. Практически полностью скованная льдом планета покрыта глетчерами, бескрайними просторами тундры и огромными, словно горы, сугробами снега. Небогатая фауна планеты представлена в основном видами рептомлекопитающих, которые совмещают в себе защитные качества рептилий и более адаптивную физиологию млекопитающих (подкожный жир, густой мех, чешуйчатая кожа и саморегулирующийся метаболизм).

Тепло, поднимающееся из ядра планеты, не достигает её поверхности, но формирует подземные пещеры, ущелья в ледниках и округлые гроты, в которых находят укрытие многие животные. Следует отметить, что вблизи Хота находится нестабильное астероидное поле, и на поверхность планеты нередко обрушиваются метеоритные дожди.



Таунтаун

Таунтауны принадлежат к обширному классу травоядных рептилемлекопитающих (таковых в настоящий момент открыто и описано 15 видов).

Сильные и быстرونogie, все эти виды являются теплокровными, с саморегулирующей системой поддержания температуры тела.

Шерсть покрывает крепкую чешуйчатую шкуру, под которой находится защитный слой жира.

Питаются они замёрзшими водорослями и растениями, которые можно найти в тундре, а также мхами и лишайниками, которые растут на стенах пещер и ущелий.

Кожные выделения, проступающие сквозь чешую, имеют отчётливый неприятный запах.

Две пары ноздрей согревают воздух, прежде чем он попадает в лёгкие.

обыкновенный, или гигантский, таунтаун

Таунтауны живут стадами от 20 до 30 особей. Самки рожают живых детёнышей, а не откладывают яйца (выведение из яиц невозможно в таком холоде).

Молодняк может самостоятельно питаться сразу после рождения, в то время как самки присматривают за ним и охраняют.

сильные, покрытые грубой кожей губы приспособлены для сбора лишайников

Ушные раковины образованы чешуёй, не боящейся холода. Могут вращаться, для наилучшего улавливания звуков.

Самки при необходимости могут отгрызывать своеобразное "молоко" из зоба.

Самцы тоже обладают этой способностью, но в основном используют её для плевок, когда разозлены.

вид без шерсти — тело покрыто чешуйчатой кожей

передвигаются на двух мощных задних ногах

Покрывные мехом трёхпалые когтистые лапы. Хвост служит для равновесия при беге.

Самцы бодаются рогами, сражаясь за самку или устанавливая иерархию. Самки также могут бодаться.

ХОТ

Обыкновенный, или гигантский, таунтаун может развивать скорость до 90 км/ч и является незаменимым животным для стойких и бесстрашных поселенцев Хота, будучи для них как транспортным средством, так и источником мяса и шерсти.

После захода солнца таунтауны ищут укрытие в ледниковых пещерах или закапываются в снег, укрывающий их от холода, и засыпают, чтобы сберечь тепло.

Во сне они перестают издавать свой резкий неприятный запах, чтобы не привлекать хищников.

ДРУГИЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ВИДЫ ТАУНТАУНОВ:

Ледниковый таунтаун обитает в ледяных пещерах и каньонах. Отличается более редким мехом и поджарым телосложением, чем гигантский таунтаун, а также известен своим смешным тонким криком.


Лазящий таунтаун — самый мелкий вид таунтаунов. Сильное жилистое тело и когти позволяют ему карабкаться по стенам ледниковых пещер и каньонов в поисках лишайников.

Во время особенно долгих и свирепых снежных буранов на Хоте разные виды таунтаунов могут пастись вместе в ледниковых пещерах.

лазящий таунтаун



настенный лишайник




наземный лишайник

детёныш
обыкновенного таунтауна

обыкновенный (гигантский)
таунтаун

ледниковый таунтаун



Вампа

Вершиной пищевой цепи на Хоте является вампа — наводящий ужас хищник, известный своей мощью и свирепостью. Вампа — плотоядное рептиломлекопитающее. Он охотится, подстерегая добычу из засады и застигая её врасплох; в длительную погоню ввязывается редко. Питается в основном таунтаунами (а также их наездниками).



Вампа может передвигаться как на двух, так и на четырёх ногах. Предпочитает он последний вариант, поднимаясь на задние лапы только когда подкрадывается или бросается на добычу.



Перед нападением вампа встаёт на задние лапы для лучшего обзора, после чего совершает смертоносный бросок.

Вампы живут в ледяных пещерах. Они сбрасывают оственную шерсть и собирают её для гнёзд. Зоологи не пришли к окончательному выводу, сознательное это поведение или всего лишь инстинкт.

Вампы нанизывают добычу на большие сосульки или прикрепляют к потолку пещеры слюной, чтобы сохранить мясо свежим. Слюна также служит анестетиком для жертв.

жёлтые глаза




Как у вамп, так и у таунтаунов одинаковые загнутые рога, но эти виды не родственны.

Самка приносит до трёх детёнышей и выкармливает их. Не стоит приближаться к вампе с детёнышами.

ХОТ


Гигантский космический слизень

Космические слизи — гигантские червеобразные существа, способные вырастать до 900 метров. Представляют собой кремниевую форму жизни (скорее неорганическую, чем животную) и могут существовать в отсутствии атмосферы. Они закрепляются внутри пещер и в основном переваривают окружающий их камень.



Космические слизи живут невероятно долго (точных данных нет), а когда умирают, то окаменевают, сливаясь со скалой. Размножаются делением.

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО СЛИЗНЯ



Майнок




Майноки — кремниевые паразиты, питаются кровью и кишечными оболочками космического слизня. Также поедают энергетические кабели и другие проводники энергии. Размножаются делением.

У некоторых видов имеются дополнительные рты-присоски для паразитического питания.

Хотя космический слизень проглатывает всё, что попадает ему в пасть, в основном он получает питательные вещества из астероида.

Наиболее крупные экземпляры водятся в астероидном поле Хота. Более мелкие особи встречаются по всей Галактике.

Дагоба



Информация о планете

Ландшафт: болота, заболоченные реки

Виды: животный мир джунглей

Язык: нет

Атмосфера: кислородная смесь

Интересные места: хижина Йоды, пещера Тёмной стороны


Издали Дагоба выглядит планетой прекрасной и таинственной: её окутывает настолько густая и плотная атмосфера, что из космоса видны лишь клубящиеся облака, и невозможно разглядеть полностью скрытую ими поверхность. Тем не менее, стоит спуститься в атмосферу, и восхищение сменяется тревогой: действующие вулканы и электрические бури порождают сильные ветры, постоянно меняющиеся цвета атмосферных газов и резкие изменения освещённости. Более того, трёхполярная гравитация планеты подвергает снижающийся корабль гравитационным ударам, непрерывно меняющим его скорость, в то время как он сталкивается с тем, что некоторые учёные считают потоком восходящего пратеона. Этот невидимый, пока ещё научно не доказанный элемент окружает корабль, замедляет его движение и затягивает, словно дистанционным управлением, в туманный полумрак внизу. Какова бы ни была причина этого феномена, кораблём над Дагобой почти невозможно управлять, кроме как на низкой высоте.

Первобытный сумрак окутывает поверхность планеты. Туман поднимается из болот, деревья придавлены весом фосфоресцирующих мхов, стаи древних джубба-птиц рассекают небеса. К счастью, стоит лишь спуститься ниже затянутых тучами верхних и средних слоёв атмосферы, управление кораблём приходит в норму и можно без опаски искать подходящее место для посадки.



Гигантский болотный слизень

Гигантский болотный слизень — огромный полуводный моллюск, обитающий в мелких водоёмах дагобских болот.



ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ БОЛОТНОГО СЛИЗНЯ

Оставляет отчётливо заметный
слизистый след.

Хотя болотные слизи являются гермафродитами, им
требуется пара для воспроизводства. Каждый из пары
слизней откладывает в болотный ил сотни яиц,
но большую их часть поедают другие хищники.


Всеядные и прожорливые, болотные слизи втягивают
и перетирают любой органический материал,
который им попадает.

Тысячи мелких перемалывающих зубов, усеивающих
всю глотку, превращают любое растение или животное в
питательную массу.



спаривающиеся слизи

псевдоподии для хватания и для
спаривания



Дракозмеи и другие обитатели

Дракозмеи

Огромный всеядный суперхищник незаметно скользит под водой, чтобы в нужный момент взметнуться на мощном хвосте и полоснуть добычу бритвенно-острыми когтями.



вид сверху

У дракозмеев сильные хвосты, предназначенные для передвижения

Иногда их можно увидеть греющимися на скалах.

Нхарпира



Небольшая хищная водная амфибия. Проворство и быстрые челюсти позволяют ей схватывать добычу прежде, чем та поймёт, что происходит.

Дагобский питон

Этот плотоядный хищник может проглотить добычу в 15 раз больше собственного веса.



Охотится, обвиваясь вокруг низко висящих веток и подстерегая жертву.

острые колющие зубы на хвосте


Морп

Родственник нхарпир, столь же опасный. Закрепляется в норах и парализует добычу ядовитыми укусами.




Скрендж

Крупные амфибии с зазубренными хвостами. Для нападения поднимаются из ила на членистых ногах.



биолюминесцентные наросты

У многих амфибий имеются биолюминесцентные пятна, чтобы освещать дорогу в густом подлеске или приманивать добычу.



голова дракозмеи — вид спереди

ДАГОБА

Светопятнистый ленивец

Светопятнистый ленивец — покрытое водоотталкивающим мехом млекопитающее, которое питается мясистыми растениями ладии. Ленивец освещает растение фосфоресцирующими пятнами у него на груди, и ладия распускает листья на свет, открывая спрятанные под ними цветы и ягоды, которые ленивец тут же поедает.




фосфоресцирующие пятна

Ладия

Жук-мясник

Ракообразная арахнида, которая плетёт среди упавших веток и корней деревьев тончайшую, бритвенно-острую паутину, способную разрезать на куски попавшую в неё добычу.



рудиментарные глаза исчезают, как только паук укореняется

пауки в коконах



болотокрыла

растущее узловатое дерево

ДАГОБА

Узловатый белый паук

Вопреки распространённому заблуждению, узловатый белый паук — это вовсе не паук и даже не животное, а спора огромного, раскидистого узловатого дерева.

Споры узловатого дерева настолько схожи с животными передвижением и питанием, что точно классифицировать их как растения или как животных не представляется возможным; однако, взрослая стадия этого существа, бесспорно, является растением. Узловатые белые пауки развиваются в коконах на корнях дерева. Достигнув зрелости, пауки покидают коконы. В этот период они служат пищей многим хищникам, в том числе болотокрылам и джубба-птицам. Уцелевшие пауки укореняются в иде и покрываются хитиновой корой, из которой начинают отрастать корни и ветви.

джубба-птица

Поперечный профиль дождевого леса Дагобы



Жизнь в пологе леса

АКСИПИПТЕРО — самая крупная рептоптица на Дагоба. Охотится на обитателей лесного полога, редко спускаясь на нижние ярусы.

ДЖУББА-ПТИЦА — вид забавных рептоптиц, которые питаются летающими насекомыми. Лепит гнёзда на ветках и стволах деревьев из грязи, которую собирает на берегах рек.

болотокрылы отгоняют аксипиптеро от своего гнезда

большой болотокрыл

БОЛЬШОЙ БОЛОТОКРЫЛ — рептоптица, которая охотится на древесных грызунов в верхних ярусах леса. Более мелкий подвид — малый болотокрыл — ищет добычу на нижних ярусах.

В джунглях Дагобы обитает множество видов грызунов. Два вида, которые встречаются на всех ярусах, это листохвост и лопатоголовая смука.

Перепончатый хвост служит для равновесия и маскировки.

щёки способны растягиваться, вмещая запасы синегоро

голова лопатоголовой смуки — вид спереди

щелкый хвост


Листохвост

малый болотокрыл

Лопатоголовая смука

Приносит до пяти детёнышей в одном помёте. Селится на деревьях в дуплах, которые выгрызает острыми зубами. Кожистые локтевые складки позволяют смуке планировать во время прыжка. Питается ягодами, орехами, а также птенцами и яйцами джубба-птиц и болотокрылов; не побрезгует и детёнышами листохвоста.

Набу: Тид и окрестности



Информация о планете

Ландшафт: болота, луга

Расы: люди, гунганы

Язык: общегалактический, гунганский

Атмосфера: кислородная смесь


Интересные места: королевский дворец Тида, подводный город Ото-Гунга

Набу — богатая водой планета, вращающаяся вокруг звезды в центре одноимённой системы. Вода покрывает 50 процентов поверхности планеты, а также проникает в её толщу сквозь похожую на лабиринт систему подземных рек, каналов и океанов. По этой системе, в сущности, возможно путешествовать прямо через центр планеты, пересекая её насквозь.


ТИД — город, расположенный в северо-западном квадранте планеты, столица Набу и одно из красивейших мест в Галактике. Мягкие пологие холмы, сочные зелёные луга, в определённые сезоны превращающиеся в ковры полевых цветов, густые леса, журчащие ручьи и синее небо — вот чем примечательны эти места. Климат в этой местности умеренный. И хотя здесь тоже водятся хищники, изобилие природы и благоприятные условия смягчают ожесточённую борьбу за выживание, словно каждый из видов живёт здесь с инстинктивным пониманием своей роли и места в круговороте жизни.

Шаак


Шааки славятся своим нежным мясом, а из их шкур получаются отличные кожаные изделия. Эти животные, одомашненные много поколений назад, отличаются очень низким интеллектом.




Самки шааков постоянно беременны. Сложно устроенная репродуктивная система включает несколько маток, что позволяет вынашивать потомство от разных самцов одновременно.



двухнедельный молодняк




вид сзади




вид сверху


Зубы приспособлены для щипания травы.



Самка демонстрирует готовность к спариванию.



Шааки любят валяться в прибрежной грязи, но иногда их уносит течением.



Падение с водопада для шааков лишь мелкое неудобство.

Слой амбрового жира придаёт шаакам исключительную плавучесть. Используется в парфюмерии.

пастух шааков верхом на бивнекоте



Дикий шаак имеет менее шарообразную форму, чем домашний.

НАБУ:ТИД И ОКРЕСТНОСТИ

Бивнекот

С царственными повадками, сильные, храбрые, быстроногие и сообразительные, бивнекоты отличаются острым зрением и чутким нюхом. Их одомашнивают для пастьбы шааков и для других целей.

Бивни служат для украшения и защиты. Также ими хищник прорезает шкуру добычи на охоте.

Бивнекоты образуют пары на всю жизнь и держатся небольшими семейными группами, или прайдами, которые обычно состоят из взрослой пары и их молодняка. Молодые самцы покидают прайд, достигнув зрелости, и отправляются на поиски пары. Самки находят по запаху.

Бивнекоты — прирождённые пастухи. Каждый прайд бивнекотов собирает собственное стадо шааков и охраняет его, убивая и съедая одного-двух шааков примерно через каждые семь-восемь дней.

Бивнекоты — отличные бегуны, характерный галопирующий аллюр на прямых ногах позволяет им быстро преодолевать расстояния по лесам и равнинам Набу. Длинные хвосты помогают сохранять равновесие при беге.

Бивнекоты и набуанцы

Одомашненные бивнекоты ласковы с детьми набуанцев и всегда готовы защищать их.



Одомашненных бивнекотов используют для службы в полиции. Специально обученная группа бивнекотов является верховыми животными Королевской гвардии Набу. За городом бивнекоты незаменимы на охоте, в полевых работах и в пастьбе шааков.



бивнекоты в парадной сбруе

Когда бивнекот умирает, из его бивней обычно вырезают памятные чаши, которые выставляются в жилищах или общественных зданиях.



ловля гулаамы




Бивнекоты легко приручаются, если растить их с раннего возраста, но при необходимости так же легко привыкают к жизни на воле.




самка с детёнышем

Гуалама


Гуаламы — быстрые и грациозные травоядные, которые питаются луговой травой и цветущими растениями. Обычно держатся стадами до 25 особей. В стаде один самец, который заботится о самках и детёнышах и охраняет их. Когда детёныши-самцы достигают зрелости, вожак стада их прогоняет. Молодые самцы бродят вместе с другими такими же "холостяками" по окрестностям, где ищут себе пару и дерутся друг с другом.



Жест расположения: самец ухаживает за самкой




"Где ближайший водопой?"



почувывший угрозу



тоскующий



дерущиеся самцы



при беге хвост поднят, как флаг

Королевское стадо гуалам содержится специально для королевы и её служанок. Это стадо бдительно охраняют бивнекоты.

королевский выезд на "твирлинг"



Гуарлара

Самые величественные из зверей, одомашненные гуарлары почитаются на Набу священными животными, они увековечены в литературе и геологии, а ездить на них имеют право лишь монархи. У королевы имеется личное королевское стадо, смотрители которого хранят чистоту породы.


Гуарлары живут до ста лет. Они родственны гуаламам, но крупнее их.



статуи всадников на гуарларах можно увидеть повсюду в Тиде



бивни служат для защиты



Когти помогают передвигаться по труднопроходимой местности.

Эти животные родом из холодных и снежных северных районов Набу. Зимой их шерсть становится очень длинной и густой. Подшёрсток гуарларов часто состригают и используют для изготовления гобеленов.

Шерсть гуарларов из королевских стад, живущих в мягком климате, регулярно подстригают.



в полном церемониальном убранстве



Детёныши рождаются белыми и постепенно темнеют с возрастом. Взрослые гуарлары угольно-чёрные.

Твиррл

Напоминающие хищных птиц крылатые плотоядные млекопитающие.

Охотятся на полевую и водоплавающую дичь, мелких грызунов.



самка

Самка приносит детёнышей 1-2 раза в год и в одиночку о них заботится. В помёте обычно 3-4 детёныша. Зрелости они достигают в возрасте около 4 месяцев.



клобучок на ловчего твиррла

Острое зрение, точность в полёте и невероятная скорость пикирования делают твиррла очень популярным охотничьим животным. Набуанские аристократы охотятся с твиррлами с давних времён.



Твирра может справиться с дичью на 10 процентов крупнее его самого.

Самцы издают пронзительные крики, обозначая территорию и привлекая самок.



самец

Весной самец занимает определённую территорию и спаривается с любыми пролетающими самками, проявившими к нему интерес.

Дополняют рацион ягодами.

Грейсор



Грейсоры — четвероногие плотоядные приматы, с давних пор используются набуанцами на охоте.

Дикие грейсоры охотятся стаями от 2 до 12 особей. Питаются в основном грызунами, шааками и падалью. В охоте больше полагаются на зрение, чем на чутьё.

Есть несколько пород одомашненных грейсоров — самые распространённые из них стабейды, баундеры и манадепты. Домашних грейсоров обычно держат в питомниках; держать твиррлов и грейсоров вместе не следует.

Самка приносит одного детёныша за раз и живёт с ним в норе примерно 4-6 недель, пока тот не подрастёт.

Диких грейсоров часто донимают блохи.



невтяжные когти, приспособленные для быстрого бега

длинный аэродинамичный хвост для поддержания равновесия

НАБУ:ТИД И ОКРЕСТНОСТИ.


Вурпак

Миниатюрные хищные зверьки (питаются мелкими грызунами, насекомыми и ящерицами) и любимцы набуанских аристократок.

Несмотря на обманчиво милую внешность, вурпаки храбрые и преданные питомцы, и могут быть весьма свирепыми, если их раздражить или напугать. Рот вурпака полон острых, как иголки, зубов.

В природе живут небольшими колониями у скальных выступов посреди холмистых равнин. В основном активны в сумеречные часы, выбираясь на поиски воды и добычи.

Вурпаки издают приятное умиротворяющее мурдыканье, которое переходит в жужжание, если зверёк встревожен. Отдыхают, спрятав лапы под туловище, чтобы сохранить тепло. мех вурпаков очень мягкий. Размножаются раз в год; в выводке 3-5 детёнышей.



Благодаря малому весу тела костная структура вурпака без труда позволяет им иметь восемь ног

С давних времён аристократы и аристократки Набу держали вурпаков в качестве талисманов и домашних любимцев, их носили с собой в карманах и рукавах одеяний. Вурпаки отлично согревают руки зимой. Ещё одной замечательной особенностью этого зверька является его приятный запах.




напуганный вурпак

королева Набу



НАБУ: ТИД И ОКРЕСТНОСТИ

Набу: Океанская бездна



Информация о планете

Ландшафт: болота, дуга

Расы: люди, гунганы

Язык: общегалактический, гунганский

Атмосфера: кислородная смесь

Интересные места: королевский дворец Тида,
подводный город Ото-Гунга

Бездна — общее название лабиринта тоннелей и подземных морей, которые начинаются на поверхности Набу и пронизывают её толщу до самого ядра. Хотя в большей её части вода холодная и неподвижная, здесь есть опасные подводные течения, возникающие там, где раскалённые потоки вырываются из планетарного ядра, разогревая воду до высоких температур.


Путешествие в похожем на соты лабиринте внутри планеты требует крайней осторожности, так как здесь легко заблудиться или же стать обедом немалого количества местных существ. Приведённые ниже изображения удалось запечатлеть лишь благодаря тому, что художник пообещал написать портреты высокопоставленных гунганских чиновников, в результате чего нам удалось заполучить прочное подводное такси и (относительно) бесстрашного проводника.

Множество разных существ населяют это удивительное место. У многих есть биолюминесцентные пятна или узоры, которые помогают им различать сородичей, плавать в темноте или приманивать добычу. У других имеется особое зрение, позволяющее видеть во тьме. Многие виды холоднокровны, или же отличаются оптимальным соотношением массы и поверхности тела, позволяющим экономно расходовать энергию. Вряд ли нам известна хотя бы половина тех невероятных существ, которые обитают в этих неприветливых, погружённых во тьму глубинах, и мы надеемся на более детальное исследование в ближайшем будущем.

ЛЛА — рыба с вытянутым рылом и короткими острыми зубами. Питается иоб-креветками.

Рыбы


Набуанскую Бездну населяют мириады рыб. Вот всего лишь несколько наиболее известных видов.




ТИ — крупная, округлая и прожорливая рыба. Известны случаи, когда ти проглатывали одиноких гунганов, заплывших в опасные области Бездны. Обычно ти плавают неторопливо, но могут совершать стремительные броски, преследуя добычу. В жабрах этих рыб паразитируют иоб-креветки, спасением от которых служат рыбы лаа. По этой причине ти не трогают последних.

ДАГТЕРТЫ, самые многочисленные из рыб, держатся косяками в тысячи особей. Служат пищей многим подводным хищникам.

ИОБ-КРЕВЕТКА




бинокулярное зрение



дагтерт пытается отвлечь ти


самец



самцы и самки отличаются окраской

самка


СИ — тонкие вытянутые рыбы. Их желудок может растягиваться и вмещать много еды, в том числе добычу величиной с них самих.




РЕЙ — довольно крупная, стремительная рыба. Хотя обитает и в Бездне, но больше предпочитает открытые воды и поверхность океана. Объект спортивной рыбной ловли у гунганов.



Хвостовой плавник в виде полумесяца позволяет быстро плыть и эффектно выпрыгивать из воды.




ФАА, которых гунганы также называют ФАЙНАА, — рыбы с жёстким панцирем на теле, сплюснутым с боков. Это позволяет им обитать в узких расщелинах среди подводных камней.



НАБУ: ОКЕАНСКАЯ БЕЗДНА


Морской убийца опи — крупный глубоководный зоологический феномен, наполовину рыба, наполовину ракообразное. Гибкий, похожий на броню экзоскелет одновременно служит защитой и шарниром для разгона при нападении.



Фосфоресцирующие кончики усов приманивают добычу.


Когтистые ноги служат в основном для плавания, а также для того, чтобы карабкаться по каменистому дну или между скалами.

Двойной ряд зубов для захватывания и разрывания добычи. У самца также служит для защиты икринок.



Брачный ритуал: опи обоих полов пускают пузыри, наполненные феромонами. Это побуждает обеих рыб начать необычный, но довольно красивый "танец плавниками".

Опи вынашивают икру в пасти. Самка мечет икру рядом с самцом, тот её оплодотворяет, а потом собирает икринки в пасть, чтобы сохранять их в безопасности до момента вылупления потомства.



Самец держит икру в пасти в течение трёх месяцев.

Всё это время он ничего не ест, получая питание лишь из жировых запасов. Если его что-то напугает, он может проглотить несколько икринок, что вряд ли способно утолить зверский голод, который он наверняка испытывает за этот период воздержания.

Вылупившиеся мальки уже способны охотиться и жить самостоятельно, но при опасности прячутся в пасть самца.

Длинный липкий язык (примерно в три раза длиннее тела) способен ловить целые косяки рыбы (как правило, си, фаа и лаа).

Коло-когтерыба

Коло-когтерыба — второй по величине хищник набуанской Бездны — это гигантская угреподобная рыба с пастью, смыкающейся как ножницы, и с огромными когтистыми щупальцами, помогающими захватывать, удерживать и разрывать добычу.

аппетитный малёк опи — лёгкая добыча

общий вид головы и височно-челюстные хватательные щупальца

чувствительные отростки для обнаружения добычи

Хватательные щупальца, крепящиеся к височно-челюстному суставу, помогают проталкивать добычу в глотку.

проглатывает добычу

Только что вылупившиеся мальки коло очень уязвимы, и многие становятся добычей хищников, таких как ги.

Яйца крепятся нитями к стенам пещеры.

Желудок способен растягиваться и вмещать огромное количество добычи. После плотного обеда коло может несколько месяцев не нуждаться в пище, и залегает в спячку в подводной норе.

Коло крайне прожорливы и едят всё подряд. Бывает, что они проглатывают мальков опи живыми, и те прогрызают себе путь наружу, убивая хищника.

Устрашающее тело когтерыбы обладает природным фосфоресцирующим свечением. Другие животные спасаются бегством, едва заведя его. На брюхе коло расположено множество маленьких плавников, позволяющих рыбе плыть быстрыми, змееподобными движениями.

Обитает в подводных пещерах и туннелях.

Обычно коло живут в пещерах парами, но после того как самка откладывает яйца, она прогоняет самца, чтобы он не съел вылупившееся потомство.

Водное чудовище сандо

Самое таинственное и наводящее трепет существо на Набу, легенда и почти что миф — подводное млекопитающее, которое бороздит как подводные моря внутри планеты, так и открытые пространства поверхности океана.

Размер в сравнении с обычными видами добычи:

кодо-когтерба

морской убийца опси

гунганский подводный транспорт (бонго)

подростковый детёныш

РАЗЛИЧНЫЕ
КОЖНЫЕ ПАРАЗИТЫ

сан-ламприс

сан-пайлот
(симбионт)

самка

Самцы могут вырастать до 200 метров, самки — как минимум до 150 метров. Точная продолжительность жизни не известна, но предположительно составляет несколько сотен лет. Во время подводного брачного танца издают мурлычущие звуки. Самка приносит одного детёныша за раз и выкармливает его в течение года.

Гунганские города оборудованы специальными щитами, благодаря которым сандо не приближаются к ним. Однако, известны случаи, когда они заплывали в болота, неожиданно набрасываясь из воды на пасущиеся стада фамбаа и фалумпасетов.

Хотя у сандо есть жабры, лёгкие у них предположительно тоже имеются: известны неподтверждённые рассказы о сандо, отдыхавших на песчаных отмелях над поверхностью воды.

Сандо грациозны и повадками во многом напоминают кошачьих. Охотятся, незаметно подбираясь и неожиданно нападая

на добычу. Могут внезапно нанести удар гигантским

хвостом и так же быстро

исчезнуть. У этих животных отличное зрение и бритвенно-острые зубы и когти.

90 процентов времени проводят отдыхая на подводных скалах, переваривая добычу и экономя энергию.

подводный брачный танец

НАБУ: ОКЕАНСКАЯ БЕЗДНА

Набу: Гунганские болота



Гунганские болота кажутся бескрайними, занимая большую часть поверхности Набу. Это родина гунганов, в честь которых болота и получили своё название. Болота представляют собой сложную первозданную экосистему — затейливый пейзаж из заболоченных равнин, приливных бассейнов, внутренних морей, трясин, рек, лугов, прудов и озёр, а также одиноких горных вершин, скал и утёсов. Их фауна необычайно разнообразна, и большинство её представителей ещё официально не изучено. Хотя большая часть болот находится довольно далеко от экватора, воздух здесь жаркий, влажный, липкий и насыщенный насекомыми. Прокладывать путь через

Гунганские болота непросто, так как русла рек и каналов постоянно приобретают иные очертания, меняются и видоизменяются, создавая впечатление, будто сам окружающий ландшафт оживает и пытается проглотить вас.



Информация о планете

Ландшафт: болота, луга

Расы: люди, гунганы

Язык: общегалактический, гунганский

Атмосфера: кислородная смесь


Интересные места: королевский дворец Тида, подводный город Ото-Гунга



Фалумпасет

Фалумпасеты — крупные травоядные. Держатся небольшими стадами, которые обычно состоят из одного самца и 4-7 самок с детёнышами. Длинные, похожие на ходули ноги идеально приспособлены для ходьбы вброд по болотам. Также фалумпасеты отлично плавают.

самка с
детёнышем



У диких фалумпасетов есть косматые щётки на ногах для защиты от кусачих ньюрков и т.д.

Имеют привычку издавать рёв в сумерках и на рассвете.


Икопи

Высокие млекопитающие с длинными, телескопически вытягивающимися ногами. Икопи лучше бегает, чем плавают, а также могут резво пересекать болота вброд. Часто можно видеть, как их стада гарцуют через мелководья.

У икопи короткая шея, что, вероятно, имеет защитную функцию. Это компенсируется длинным трубкообразным языком (в два-три раза длиннее головы), позволяющим как собирать корм высоко над головой, так и пить воду, находящуюся ниже уровня колен.

подый язык позволяет пить воду или нектар как через соломинку

свёрнутый язык в защёчном мешке



ТЕРАЗОД

Теразоды — крупные миролюбивые полуводные млекопитающие. Пасутся на болотах и отдыхают на влажных песчаных отмелях.

НАБУ: ГУНТАНСКИЕ БОЛОТА

Мотт

Среднего размера (примерно 1 метр в холке) полуводные травоядные, обитающие в норах на илистых берегах. Питаются разнообразной растительностью, сами же являются основным источником еды для многих болотных хищников. Гунганы также

иногда охотятся на моттов. К счастью, те отличаются высокой плодовитостью (около 15 детёнышей в одном выводке).

Поза угрозы и доминирования, характерная как для самцов, так и для самок.

Отлично плавают. Молодняк часто катается на спинах у взрослых.

рог на носу для выкапывания корма

острый слух

дремающий мотт

Мотты живут колониями до 15 взрослых особей. В стаде обычно один доминантный самец; иногда у него также есть помощник, который помогает охранять самок и детёнышей.

ГЛАВНАЯ НОРА

ГНЕЗДО САМКИ С ДЕТЁНЫШАМИ

Пеко-пеко

Пеко-пеко — крупные сильные рептиоптицы, чей резкий хриплый крик разносится на многие километры.

Птицы обоих полов отличаются красивым индигово-сапфировым оперением.

Могут собираться большими стаями, но обычно держатся парами, которые образуют на всю жизнь. Самцы и самки одинакового размера.

мощные крылья

вид снизу

Кожа достаточно ядовита.

Большинство животных не трогают пеко-пеко, так как содержащийся в них яд вызывает боли в животе, рвоту, а в некоторых случаях и летальный исход. Впрочем, некоторые животные к яду невосприимчивы.

Мощный клюв способен раскалывать самые твердые орехи. Также пеко-пеко питается яйцами кааду и мелкими животными. Орехи и семена некоторых растений приобретают способность прорасти только после того, как пройдут пищеварительный тракт пеко-пеко.

острое зрение

Когти на крыльях помогают карабкаться.

Отлично имитируют звуки, издаваемые многими другими животными. В неволе их легко научить говорить, что делает пеко-пеко любимыми домашними питомцами гунганов и набуанцев.

Строят гнезда высоко в дуплах деревьев. Самка откладывает два яйца за одну кладку. О птенцах заботятся оба родителя.

строение скелета

НАБУ: ГУНГАНСКИЕ БОЛОТА

Пикоби


Быстрые нелетающие рептилии, пикоби ловят рыбу и ищут в иле мелких животных (галлипадов, ньюрков, даггертов, ракообразных и т.д.). Хорошо бегают и ходят по мелководью, способны преодолевать большие расстояния как по болоту, так и по твёрдой земле. Длинным тонким клювом с острыми зубами могут прокалывать и удерживать скользкую добычу.



длинный хвост для поддержания равновесия при беге

Широкими перепончатыми лапами отбрасывают тень на воду, приманивая рыбу.

Проглатывают добычу целиком.



Пикоби могут отбрасывать хвост, если на них нападают. Он быстро отрастает заново, иногда становясь при этом раздвоенным. Обладают поразительными способностями к регенерации; учёные изучают этих животных в медицинских целях. Держатся парами или группами по 5-6 особей. Откладывают яйца в песок. Птенцы способны ходить и плавать сразу после вылупления.

острое зрение

в отличие от большинства рептилий, имеют наружные ушные раковины

В надутом состоянии пружинят, как мячики. Гунганы играют вспугнутыми галлипадами в "галлибол".

Галлипад

Неуклюжие амфибии с отвислой кожей, галлипады могут раздуваться как шар и растопыривать шипы так, что их становится трудно схватить и проглотить.




НАБУ: ГУНГАНСКИЕ БОЛОТА

Нуна

Нуна, также известная как "болотная индейка" — повсеместно распространённая нелетающая рептиптица, отличающаяся высокой плодовитостью. Различают такие виды, как обыкновенная нуна и карликовая нуна. Это исконный вид набуанских болот, но нун также вывозили на другие планеты

Галактики в качестве домашних питомцев, несущек, мясных животных или просто диковинок. Нуны славятся своей глупостью и любопытством: известны случаи, когда они забредали на стоявшие в космопортах корабли, распространяясь таким образом по другим планетам.

самка с птенцами




Самцы демонстрируют агрессию шипением и раздуванием серёжек.

поза подчинения



Лапы снабжены когтями, чтобы разрывать дерн. В основном нуны питаются растениями, но также могут поедать мелких беспозвоночных и червей.


серёжки



выражает агрессию шипением

Самка откладывает одно огромное яйцо (это выглядит почти невероятным). В одном яйце может развиваться до 10 птенцов. Температура внешней среды, по всей видимости, определяет пол вылупившихся птенцов.

обыкновенная нуна




размер яйца перед откладыванием

На нун охотятся многие хищники, однако их популяция процветает благодаря умению быстро бегать, хорошей приспособляемости, устойчивости к болезням и высокой плодовитости.

карликовая нуна

птенец обыкновенной нун



Самка помогает птенцам выбраться из скорлупы.


хищный пикоби с птенцом нун



НАБУ: ГУНГАНСКИЕ БОЛОТА

Кааду

Эти крупные нелетающие рептилии отличаются внешне неуклюжей манерой двигаться, но славятся при этом своей быстротой и проворством. В природе самки и самцы обычно держатся отдельно, стадами от 20 до 100 особей. В брачный сезон стада перемешиваются; самцы кааду в этот период приобретают более яркую окраску.



самец в брачной расцветке

короткий хвост служит противовесом

тугие кольцеобразные когти обеспечивают устойчивость

В выводке 6-8 детёнышей, способных ходить сразу после вылупления.


Сбруя скакуна гунганской кавалерии включает седло из кожи фамбаа, заседельный тюк, и специальные наглазные шоры, чтобы кааду не отвлекался на посторонние предметы. Перья титавиана указывают на высокий ранг наездника.

Одомашненные кааду — основное верховое животное гунганов. Они растут кааду с самого вылупления, формируя привязанность на всю жизнь. Кааду содержат в подводных стойлах, прикрепленных к оболочкам городов-пузырей.

неловкий момент — кааду сбрасывает седока




необычный раскачивающийся галоп



Кааду отлично плавают. Их тело под водой принимает обтекаемую форму для лучшего ныряния. Большой объём лёгких позволяет долго — до двух часов — обходиться без воздуха.

Кааду питаются улитками, тликом-травой и водными растениями. У них нет верхних резцов, поэтому траву им приходится щипать.




Оставленные без присмотра яйца часто становятся добычей всеядных пеко-пеко.

Самки кааду строят гнёзда в виде земляных холмиков, которые выстилают растительным материалом. Откладывают обычно по 10-12 яиц в одну кладку.

НАБУ: ГУНГАНСКИЕ БОЛОТА

Фамбаа

Крупнейшие наземные травоядные набуанских болот, фамбаа являются амфибиями, хотя покрыты чешуйчатой кожей, больше характерной для рептилий.



Фамбаа с лёгкостью валят деревья, чтобы добраться до листьев и ягод. Также питаются подводными растениями.

икринка с эмбрионом в натуральную величину



перистые жабры




только что вылупившаяся личинка

спиралевидный кишечник виден сквозь прозрачную кожу на брюхе

Самки откладывают множество липких студенистых икринок в лужах и под водой. У вылупившегося молодняка влажная кожа, а также имеются жабры. С возрастом жабры исчезают, а кожа затвердевает.

В дикой природе фамбаа кочуют стадами численностью до 12 особей.

Много тысячелетий назад фамбаа были одомашнены гунганами, которые используют их в качестве вьючных животных, а также тягловых животных для кавалерии и артиллерии. Племенные стада настолько многочисленны, что их обычно пасут на болотах в священных местах.



Специальные стойла для фамбаа оборудованы в подводных городах гунганов.

Каждому своё: примеры экологических ниш

Виды или группы видов, которые обитают вместе на одной территории и не конкурируют друг с другом за пищевые ресурсы, занимают разные экологические ниши.

Ниши могут включать в себя растения или животных.
На болотах гунганов насчитывается около 500 таких ниш.

Если кормовая база истощается или природные условия меняются, виды могут начинать вторгаться в экологические ниши других видов или разрушать их.

Теразод, фалумпасет и фамбаа — представители трёх разных экологических ниш: все они травоядные, занимающие одну территорию, но способы питания у них различные.

Фамбаа, в силу своих размеров и вкусовых предпочтений, питается донными растениями с прочными стеблями. Фалумпасет может достать ракообразных и водоросли лишь на средней глубине. Теразод плавает и кормится на поверхности воды.

иоб-креветка и иоб-краб —
конкурирующие обитатели одной ниши

теразод

фалумпасет

фамбаа

Хрумф

Могучие травоядные с толстой

шеей, хрумфы получили своё название за издаваемые ими гуакие горловые звуки.

Четыре длинных рога служат для защиты, а также прикрывают пару длинных чувствительных ушей. Хрумфы отличаются близорукостью и раздражительным нравом, и без колебаний бросаются на источник угрозы.

Непривередливы в еде. Острый клюв позволяет как щипать жёсткую траву зоша, так и обгладывать кору хсу-ягодных деревьев, тасслера и хайденока.

Хрумфы — крупные животные, от 3 до 4 метров в холке.

шкура почти не имеет шерсти

Косматые пётики на ногах защищают от укусов ньюрков и других ракообразных.

На удивление хорошо прыгают, несмотря на массивное телосложение.

подгибают колени, чтобы достать низко растущую траву

хрумфы помогают друг другу отгонять мух

Самки хрумфов приносят одного детёныша за раз. Стадо защищает молодняк, выстраиваясь вокруг него кольцом и встречая опасность рогами вперёд.

хрящевые защитные шипы



Муудабок

Эти болотные травоядные делают экологическую нишу с терзодами. Предпочитают заболоченные леса, но иногда их можно видеть и на мелководьях, где они щиплют траву минтри и вуша.



Главным врагом является нарплатч.


Особый скачущий галоп в полной мере использует способность животного к длинным прыжкам.




Из рогов муудабок гунганы делают музыкальные инструменты.

Муудабокам часто приходится пересекать водоёмы, перебираясь с одного пастбища на другое; как и большинство обитателей болот, эти животные имеют обтекаемые очертания тела, помогающие им плавать. Под воду не ныряют.

Рога у самок характерной луковичной формы.



Плавучие шишки на хвосте могут служить как поплавками, так и оружием.




В брачный сезон самцы трубят и режут, привлекая внимание самок, и собирают гаремы, которые охраняют от других самцов. После брачного сезона самцы слабеют, становясь уязвимыми для хищников.

Когтями выкапывают корни и молодые побеги из-под травяного перегноя.



Оллопом

Оллопомы — миролюбивые водные грызуны, живущие на поверхности болот.



Короткий плотный зелёный мех маскирует животных под листья пома, которыми они питаются.

вид снизу — видны зубы грызуна и три пары веслообразных лап


хвостовой плавник служит как руль

На голове растут длинные усики, мимикрирующие под соцветия пома. Когда пом цветёт, то точно так же распушаются и усики оллопомов.

Детёныши держатся на хвосте матери.

Пом-прыгун

Пом-прыгуны — небольшие изящные травоядные. Очень мало весят благодаря тонким пористым костям. Ноги с широкими перепонками позволяют прыгать и балансировать на больших листьях пома.




самец

самка

Клыки служат для защиты и для откусывания листьев и соцветий пома

Пом-прыгуны спят и прячутся, вися вертикально под водой. Дышат они при этом сквозь трубкообразные ноздри.



передвигаются прыжками

Тук

Туки — маленькие забавные прыгающие грызуны. Очень быстро размножаются. Питаются болотными орехами и ягодами.



большие чувствительные глаза
позволяют видеть в темноте

чуткие усы

В помёте восемь детёнышей. В двухнедельном возрасте уже полностью самостоятельны и способны размножаться.

Основным врагом является туколовка: запах этого растения идентичен запаху брачных феромонов туков, перед которым зверьки не могут устоять. Однако, у туков быстрая реакция, и нередко им удаётся в последний момент увернуться от хищного растения, кувыркнувшись назад.



защитный кувырок



удачно поохотившаяся
туколовка

Широ

Неторопливые безобидные рептилии с твёрдым панцирем. Прятаться внутри покрытого шипами панциря — их главный способ защиты.

Питаются минтри, зэлом, гран-лозой, чак-корнем и иногда моллюсками и ракообразными, которых находят в иле. Мясо широко популярно в гунганской кухне.




пилозубый гранк

Главным врагом является пилозубый гранк, чьи мощные челюсти способны разгрызть панцирь.

"широ-ловка", спрятавшаяся в панцирь

Земляной прыгун

Глухие, плодовые и прожорливые травоядные. Сильные передние ноги служат для того, чтобы искать корм и прыгать.



Земляные прыгуны поедают туколовку.

НАБУ: ГУНГАНСКИЕ БОЛОТА

Залаака

Залааки — быстрые, сообразительные и свирепые всеядные животные. Поведение их мало изучено. Обитают в основном на лесистых возвышенностях, но также отлично плавают. На взрослых залаак не рискует нападать даже нарглатч, в то время как сами залааки могут убивать и поедать нарглатчей.

Диморфизм в окраске: синяя с жёлтым шкура у самцов, крапчато-синяя — у самок.

отлично видят в темноте

моляры для жевания

режущие клыки

самец

острые когти

плавник на хвосте помогает при плавании

Ритуал посвящения у гунганов — поймать детёныша залааки с целью вырастить из него потом боевого скакуна. Опасная миссия, которая далеко не всегда увенчивается успехом.

Поскольку залааки — естественные враги кааду, это серьёзное испытание храбрости не только для всадников, но и для их скакунов.

Брачные повадки изучены слабо.

Предположительно залааки живут семейными группами из одного самца и от одной до четырёх самок с детёнышами. Самка приносит одного детёныша раз в 10 лет.

отдыхающая залаака

Могут ли залааки быть родственниками сандо? Анатомическое сходство весьма заметно.

шпоры


Полностью обезжуженная залаака (хотя таковые встречаются редко) становится свирепым, но верным боевым скакуном, который будет защищать седока и яростно атаковать противника.

дрессировка залааки

Ездить стоя верхом на залааке — высшая степень искусства наездника.

Шаупот


Шаупоты — хищные древесные сумчатые. Свесившись вниз головой с веток, ловят птиц длинными загнутыми когтями. Наиболее активны в сумерках.



Самка приносит больше детёнышей, чем может прокормить молоком, поэтому самые слабые погибают. Остальные детёныши прячутся в сумке у матери, пока не подрастут. Выбравшись наружу, они обычно путешествуют на спине и животе самки.

Большие глаза позволяют видеть в сумерках.


Чувствительные усы помогают поддерживать равновесие.



Отта

Небольшие игривые хищные млекопитающие. Отты питаются рыбой, охотятся на олопомов, туков и пом-прыгунов. Могут раскалывать раковины ньюрков камнями.


Детёныш держится за брюхо матери.



Любопытные, смелые и игривые животные.



Эти очень подвижные водные зверьки в воде могут уйти от любого хищника, а сами почти всегда настигают свою добычу.




Пара отт совместно охотится на дагтертов.



Олопомы — обычная добыча отт.

Благодаря очень гибкому позвоночнику отты изумительно ловко двигаются как в воде, так и на суше.

Роют норы в илистых берегах и селятся в них группами, или кланами.



НАБУ: ГУНГАНСКИЕ БОЛОТА

Вирмок

Вирмоки — крупные, свирепые приматы, которые обитают в лесах по берегам болот и охотятся из засады. Избегают глубокой воды, так как плохо плавают.



нападает на быстрого, но беззащитного джимбу



Необычный скачущий аллюр использует преимущество мощной верхней части тела вкупе с длинными сильными руками.



Самки спариваются раз в год, и строят на земле гнёзда из листьев и веток. Беременность у вирмоков длится три месяца. Обычно рождаются два детёныша, которых мать сразу же бросает (в отличие, например, от ранкоров). Вынужденные сами о себе заботиться, детёныши взрослеют быстро.

Обычно держатся поодиночке, кроме сезона размножения. Частично проявляют территориальное поведение, обычно (но не всегда) защищая свою территорию от других вирмоков.

Мех на спине и груди служит для защиты, в том числе от холода. Шерсть на спине встаёт дыбом, если зверь встревожен или разъярён. Отсутствие шерсти на нижней части тела помогает поддерживать чистоту.

сильные трёхпалые лапы с когтями, чтобы хватать или цепляться



Нарглатч

Нарглатч — бесшумный главный хищник болот. Охотится в одиночку — в основном на кааду или джимву, незаметно подкрадываясь и быстро расправляясь с добычей. Избегает глубоких водоёмов, хотя неплохо плавает при необходимости. Также избегает залаак.

Половой диморфизм проявляется в строении шкуры: у самца есть мясистые шипы на хребте, в то время как самки более гладкие.

Всёобразный хвост служит как руль при быстром беге и поворотах.


Самцы и самки контактируют только в период размножения. Самки — более свирепые охотники, чем самцы, но самцы могут отбирать у самок добычу.

самец

невтяжные когти



Толстые подушечки на лапах помогают двигаться бесшумно.




Так как детёныши способны охотиться сразу после рождения, самка бросает их. До наступления зрелости детёныши держатся и охотятся вдвоём, что делает их менее уязвимыми для гранков, вирмоков и взрослых нарглатчей-самцов. В возрасте двух лет детёныши расходятся, начиная жить поодиночке.

Самка всегда приносит двух разнополых детёнышей.

детёныш-самка

детёныш-самец




Бларт

Бларты — среднего размера хищники, которые питаются нюрками, боулампами, галлипадами, иоб-крабами, иоб-креветками и другими мелкими ракообразными и моллюсками. Дружелюбные и легко приручаемые, бларты с незапамятных времён были у гунганов домашними любимцами и сторожевыми животными.




Бларты удивительно проворны и быстры, несмотря на упитанное телосложение. Постоянно пыхтят и пускают слюни. Остерегайтесь чихающего бларта!

Толстый слой подкожного жира придаёт плавучесть и сохраняет тепло, позволяя бларту находиться под водой до двух часов. Бларты могут усваивать кислород сквозь кожу.



бларт держит хвостом пучок перьев, приманивая нюрку

Бларты получили своё название за издаваемые ими звуки, напоминающие отрыжку — "бларт-бларт-бларт"



короткие хватательные "хвостовые пальцы"



Гунганы широко используют слюну бларта для разных целей. Из неё делают мази для кожи, основу для парфюмерии, чистящие средства и даже вещества для укрепления стенок подводных городов-пузырей.



Домашних блартов можно увидеть повсюду. Особенно они предпочитают общественные места, дверные проёмы, шумные помещения, где они любят развалиться, ожидая внимания. Обычным неудобством при этом являются лужи слюны.

Дети гунганов любят брать слюнявых щенков с собой в кровать.



Самка приносит трёх-четырёх щенков один-два раза в год. Вылизывание успокаивает детёнышей и стимулирует выработку гормонов.



Айва

Айвы достигают 8-10 метров в длину и внешне напоминают альдераанских и беспинских трант. Представляют собой летающих китообразных: широкие крылья и мощные грудные мускулы позволяют им грациозно двигаться как под водой, так и в воздухе. Живут небольшими стаями и питаются крилем, даггертами и другой рыбой.


гладкая и упругая водоотталкивающая кожа

Айвы ловят рыбу и просто зубами, и фильтруя воду через китовый ус. Под водой издают пронзительные звуки, загоняя рыбу.

Могут, выныривая из воды, сразу же подниматься в воздух. Способны пролетать большие расстояния в поисках добычи.

Голова айвы, вид спереди

положение крыльев при пикировании



китовый ус

острые зубы для удерживания добычи

мускулистый язык

При полёте издают высокий свистящий звук. Имеют природные сонар и радар — сонар для ориентировки под водой, радар — при полётах в темноте.

хвост служит как руль, а также для ускорения

небольшие короткие задние конечности практически бесполезны на суше, поэтому айвы предпочитают приземляться в воду

Лёгкие снабжены воздушными мешками, заполняющими всю полость тела, что придаёт плавучесть и помогает при взлёте. Подые кости имеют ячеистую структуру, что увеличивает их прочность.

Гунганы одомашнивают айв для езды верхом и перевозки грузов по воздуху.

Титавиан (гофф-птица)


Ещё одно полупоупендарное существо.

когти на крыльях помогают
цепляться за скалы и уступы

Эти гигантские рептоптицы имеют огромные крылья и очень мощные грудные мышцы, чтобы приводить эти крылья в движение. Из-за своих размеров титавианы не способны к длительному полёту. В основном они планируют над морем.

Титавиан — огромная рептоптица, обитающая на вершинах гор и скал на самых отдалённых берегах океанов и болот. Животные эти мало изучены, и известны в основном лишь по слухам.

Предположительно питаются падалью, так как в местах их обитания находили кости крупных морских существ. Также предположительно откладывают яйца, хотя никому ещё не удавалось увидеть гнездо или птенцов титавиана.



Гигантский размах крыльев позволяет поднять в воздух столь массивное тело.

100 метров

Ритуал посвящения у гунганских воинов состоит в том, чтобы добыть перья титавиана, для украшения седел своих кааду. Задание крайне опасное: хотя титавианы не агрессивны, один случайный взмах крыла может убить и айву, и её всадника.




Титавианы обитают на скалах и уступах — как для защиты, так и потому, что не могут взлетать с земли. Им необходимо "упасть" с высоты, чтобы поймать воздушные потоки.

На поверхности земли они уязвимы, и им приходится карабкаться обратно на высокие скалы, чтобы снова подготовиться к взлёту.

НАБУ: ГУНГАНСКИЕ БОЛОТА

Беспин



Информация о планете


Ландшафт: облака

Расы: утноты и другие расы

Язык: общегалактический,


Атмосфера: кислородная смесь

Интересные места: Облачный город, Тибаннополис



Беспин, самая удалённая планета в одноимённой системе, это огромный газовый гигант с твёрдым металлическим ядром, в котором температура достигает 400 градусов. К счастью для исследователей, над раскалённым ядром простирается плотный и пригодный для жизни облачный слой, "зона жизни", которая сама, в свою очередь, делится на несколько слоёв. Она примечательна отсутствием твёрдой поверхности, изобилием всевозможных форм облаков, многообразием воздушной растительности, широким спектром освещения, стабильной температурой и богатым животным миром.

Многие из наиболее высокоразвитых существ здесь имеют аэродинамичную мускулатуру или строение тела, пригодное для воздухоплавания, что позволяет им маневрировать среди ветров и восходящих воздушных потоков. Многие способны усваивать питательные вещества и влагу прямо из атмосферы. У немалой части местных животных есть фосфоресцирующие пятна на теле, из-за чего ночью небеса Беспина озаряются светом мириадов существ, кружащихся в атмосфере планеты, словно крошечные мерцающие звёздочки.



Белдон

Гигантские (от 800 метров до 10 километров в диаметре) наполненные газом создания, которые усваивают природные вещества и биосферный планктон из густых нижних слоёв атмосферы. Беспина с помощью длинных, спускающихся щупальцев, работающих как трады.

Белдоны дрейфуют в атмосфере, держась стадами. Они мечут икринки и молоки прямо в атмосферу, где они парят вместе с планктоном, и в случайном порядке происходит оплодотворение.

хвостовой плавник, поддерживающий равновесие

Белдоны вырабатывают газ тибанна, который добывается из атмосферы и используется как охладитель для гипердвигателей.

Окружены небольшим электрическим полем, которое помогает вовремя почуять опасность.

Светочувствительные клетки кожи участвуют в метаболизме и служат для защиты.

Размах крыльев велкера может достигать 350 метров.

Велкер

Крупные летающие рыбоподобные существа, которые охотятся на белдонов стаями. Наметив жертву, они прорывают дыры в её шкуре и кормятся по мере того как белдон сдувается и опускается вниз. Туша одного белдона может кормить сотни велкеров в течение нескольких месяцев, прежде чем опустится в ядовитые нижние слои атмосферы. Нерестящиеся велкеры вымётывают десятки икринок в атмосферу.

Тело велкеров окружено электрическим полем, с помощью которого они могут атаковать и даже вывести из строя небольшой корабль, если он приблизится к ним слишком близко.

Вид спереди — можно заметить двойные ряды острых зубов.

Раввк и летуны

Раввки — хищные млекопитающие, обитающие в дрейфующих толщах воздушных водорослей и в разрушающихся постройках заброшенных облачных городов.


Характерный крик дезориентирует добычу.



Раввки строят похожие на корзины гнёзда из стеблей воздушных водорослей. На крышах гнёзд дежурят беспокойные самцы, охраняя жилище.

Ловкое аэродинамичное тельце покрыто перьеподобным мехом. Раввки — отличные охотники; стремительно и без усталости они гонятся за разнообразными летунами, которые появляются на рассвете или с наступлением сумерек.

Раввки гонят беспинскую (альдераанскую) транту.



Стебли воздушных водорослей спускаются в нижние слои атмосферы, получая из неё питательные вещества.



примеры обыкновенных летунов

Летуны и воздушные водоросли, которыми они питаются, находятся внизу пищевой цепи.

"Летуны" — собирательный термин для тысяч мелких, обычно крылатых существ, которые парят, подобно планктону, в верхних слоях беспинской атмосферы. Многие из них ещё не классифицированы. Большинство этих существ мечут в атмосферу икру, которая часто задепляет иллюминаторы снижающихся кораблей.

Эндор



Информация о планете

Ландшафт: леса, горы

Расы: эвоки, гораксы, тики, юззумы

Язык: эвокский


Атмосфера: кислородная смесь (на Лесистом спутнике)

Интересные места: деревня эвоков, скалы Явари, саванна

Драконья шкура


Лесистый спутник Эндора — это спутник величиной с планету, покрытый дремучими зелёными лесами и поросшими густой травой степями. Он вращается вокруг планеты Эндор — серебристого газового гиганта в секторе Модделл. Вода в изобилии имеется в большинстве областей луны, и хотя из-за низкой гравитации вкупе с мощным притяжением главной планеты растения (да и многие животные) вырастают до немалых размеров, большая часть фауны представлена существами, которые осваивают свои разнообразные экологические ниши с трудолюбием, безмятежностью и умеренностью. Большинство из них травоядные, с характерными сильными челюстями и зубами для разгрызания твёрдых орехов и жевания толстокожих лесных ягод. Многие делают запасы, а некоторые впадают в спячку в период двух зимних сезонов, разделяющих пятисезонный год.

Первобытным, но хорошо организованным укладом здесь проживают коренные жители — эвоки, чьё дружелюбие и сотрудничество весьма кстати для оказавшихся здесь путешественников.




Бларрг

Бларрги — травоядные рептилии с толстой кожей. В основном известны своим маленьким мозгом и низким интеллектом. Мародёры используют их как тягловых животных.



повозка мародёров, сделанная из грудной клетки бларрга

Мозг размером с орех джубба.
Толстым черепом могут таранить препятствия.



рост бларрга в сравнении с эвоком




годовалый детёныш

Откладывают по 5-6 яиц, оставляя их там, где они упали — на земле или в зарослях. Детёныши держатся около матери первые несколько лет жизни.

Бларрги являются добычей кабановолков, а также предметом насмешек в эвокской культуре и фольклоре.

Единственным способом общения является частый низкий рёв.

Кабановолк



Кабановолки — огромные, крайне свирепые хищные млекопитающие. Нападают на любого, кто попадётся у них на пути.

Обычно охотятся парами.

Кабановолков частично одомашнили гораксы (дикие жуткие существа, живущие в пещерах).

горакс разнимает дерущихся домашних кабановолков



Кондор-дракон Крупные летающие хищные рептилии, которые гнездятся в пещерах, каньонах и на скалистых уступах. Охотятся как днём, так и ночью — обычно на мелкую и среднего размера добычу. Не брезгают и падалью.

Срываются с высоких скальных уступов и спиралью пикируют на добычу. Часто сопровождают нападение пронзительным криком.

Двое взрослых драконов не поделили невзвешенного эвока

Кондоры-драконы охотятся на гигантских пещерных пауков, а также на многих других существ.

Эвокский пони

Происхождение эвокских пони неясно. Виды, относящиеся к лошадям, обнаружены на нескольких планетах Галактики; среди них крупные чёрные лошади, на которых ездят ведьмы Датомира. Дикие эвокские пони обитают в лесах и на равнинах Эндора, а одомашненных эвоки держат в качестве верховых животных. Эвокские пони храбрые, резвые и выносливые; ростом не выше 1 метра в холке. На более крупных лошадях ездят Мародёры.

Лесных бордоков эвоки используют в качестве вьючных животных.

Известны случаи, когда самые крупные особи кондоров-драконов уносили эвоков прямо со спин их пони. Тем не менее, верхом у эвока больше шансов спастись, так как чаще кондоры-драконы принимают пони и всадника за одно существо, слишком большое, чтобы его поднять.

Кондоры-драконы не едят пони, находя их невкусными.

Заманок

Заманок — обитающая в лесах амфибия, которая длинным шерстистым языком подманивает птиц, грызунов и других лесных животных ближе к прячущейся в укрытии пасти.

поры, испускающие феромоны

нервный узел

кончик языка заманок

Джиджо

Джиджо — любопытные рептилии, известные широкой гаммой издаваемых звуков и способностью к звукоподражанию.

Строят гнёзда и откладывают несколько яиц за одну кладку. Оба родителя заботятся о беспомощных птенцах.

острый клюв помогает копать землю и строить гнёзда

множество глаз

У заманок бледная мясистая шкура, покрытая толстым слоем слизи, что позволяет им забираться в труднодоступные места и оттуда неожиданно хватать добычу, которую они подманивают языком.

широкие лапы с когтями помогают цепляться

Раггер

Раггер — основная добыча заманок. Это грызун, обитающий высоко на деревьях, а также на лугах. Травоядный; питается ягодами и орехами. Впадает в спячку во время холодного зимнего сезона.

Красивый зеленовато-белый мех (у лугового подвида он желтоватого оттенка)


Сильные острые зубы для разгрызания орехов.

Пальцы с присосками предназначены для цепляния и удержания равновесия.

На раггеров обычно охотятся юзумы.

ЭНДОР

Явин-4



Информация о планете

Ландшафт: джунгли


Расы: массасси (исчезнувшая раса), люди

Язык: массасси, общегалактический

Атмосфера: Явин — газовый гигант;
обитаемые спутники Явин-4 и Явин-8 — кислородная смесь


Интересные места: Великий храм, храмы массасси, храмы Экзара Куна

Явин-4 — четвёртый спутник, вращающийся вокруг газового гиганта Явин в одноимённой системе во Внешнем Кольце. Субтропический климат порождает на нём буйную растительность. Большая часть суши покрыта джунглями, которые пересекают долины и ущелья, прорезанные в вулканической породе быстрыми ручьями и широкими реками. Когда-то эта планета была домом для расы массасси, чьи древние храмы до сих пор усеивают ландшафт. Флора и фауна на Явине-4 захватывающе многообразна. Растения, такие как синелиственник, ползучий папоротник, туманная орхидея, гриб-граната и величественные деревья массасси служат домом и основой для сложной и довольно жестокой пищевой цепи. Вуламандры, синтарины, щепчущие птицы, раньипы и жуки-пираньи — всего лишь несколько примеров удивительных и, как правило, весьма опасных существ, населяющих планету. Животный мир на Явине-4 столь изобилует, что для его изучения достаточно лишь тихо сидеть на месте и наблюдать за открывшимся перед вами парадом биологических видов.



Вуламандра

Приматообразные полуразумные млекопитающие. Живут стаями до 20 особей на верхушках деревьев массасси. У самцов имеются горловые мешки, предназначенные для утренних "концертов".



самец


самка

детёныш в сложенных ладонях у матери

Округлое брюшко переваривает и усваивает преимущественно фруктовый рацион.

Самка приносит за раз одного детёныша, которого кормит молоком и носит с собой в сильных передних лапах.

Детёныш цепляется за брюхо матери, когда она перемещается с места на место.




Вуламандры постоянно настороже, высматривая стаи своих главных врагов — синтарилов.

Синтариал

Эти прожорливые древесные хищники стаями нападают на добычу (в основном, вуламандр и щепочущих птиц). Синтарилов постоянно в движении, даже детёныши у них рождаются на ходу (4-5 детёнышей в одном помёте).

У синтарилов очень быстрый обмен веществ: они должны постоянно есть, иначе погибнут от голода в течение двух часов. Голодные синтарилов в качестве последнего средства набросятся друг на друга, пожирая самых слабых особей.



Острые зубы, чтобы пронзать и удерживать добычу.

узловатый голый хвост помогает удерживать равновесие

Вуламандры спасаются, перепрыгивая с дерева на дерево.

Шепчущая птица

Птицы с ярким оперением, получившие своё название за бесшумный полёт и тихое мелодичное пение.

Петь помогает гибкий язык.




Обитают как на деревьях, так и на воде, держатся небольшими стаями и кормятся рыбой и водорослями.

сбрасывает рога ежегодно

Раньип

Раньип — крупное упрямое травоядное. Роет землю и ищет корм в лиственном перегное и на мелководьях ручьёв, озёр и рек. Отличается раздражительным нравом; постоянно хрюкает, сипит, пыхтит и взвизгивает во время кормёжки.

подвижные губы предназначены для поиска корма в земле



Три пары режущих жвал могут смыкаться одновременно или попарно.

Удильщик Ракообразный моллюск, который ловит водную живность, свесив длинные, похожие на корни когтистые щупальца под воду.



Аморфная подводная форма розовой саламандры, также называемая слизистой саламандрой.

Жук-пиранья

Летающие хищные насекомые, которые роем кружат над намеченной жертвой, за минуты срезая все куски мяса, до которых могут добраться.



Единственное спасение для жертвы — нырнуть под воду.

Розовая саламандра

Под водой молекулярная структура тела этой водной рептилии становится разреженной и слабо связанной. Клетки тела становятся пористыми и аморфными, удерживаясь вместе лишь слабым электрическим полем. В таком виде саламандра легко проскальзывает сквозь щупальца удильщика. На суше животное вновь приобретает плотность.

Водный гандарк


Множество глаз помогает одновременно видеть под и над водой.



Среднего размера хищник, подстерегающий раньипов и шепчущих птиц на мелководьях рек и озёр.

Примечание: "гандарками" называют несколько видов животных, обитающих в разных частях Галактики. Большинство этих видов не родственны.

Корусант



Информация о планете

Ландшафт: экуменополис

Расы: люди и прочие расы


Язык: различный

Атмосфера: кислородная смесь

Интересные места: Здание Сената, Храм джедаев




Корусант, называемый также "Жемчужиной Центральных Миров" за свою социальную, политическую, экономическую и культурную значимость, — полностью урбанизированная планета: её поверхность целиком покрывает огромный многоуровневый мегаполис. Здесь есть различные климатические зоны — холодные полюса, жаркие тропики, но сплошная городская застройка заметно сгладила их. Не считая нескольких небольших парков и крупных частных усадеб, здесь нет дикой природы, и, как следствие, большинство исконных видов Корусанта давным-давно вымерло. Тем не менее, раскинувшаяся по всей планете сложная архитектура в чём-то копирует природные условия, в которых формируются фантомные экосистемы, в основном населённые животными и растениями, завезёнными сюда с других планет или мутировавшими из исконных видов. На Корусанте высокий уровень загрязнения окружающей среды, и многие виды давно адаптировались к нему, например, выработав иммунитет. Хотя оживлённая торговля животными, привозимыми со всей Галактики, вносит хаос в существующие экосистемы, они в то же время дают возможность увидеть огромное разнообразие видов с различных планет.



Кремниевые паразиты

Гранитные слизни, дюракритовые черви и теневые прилипады — кремниевые беспозвоночные, которые кормятся зданиями и постройками. Они наносят огромный ущерб: каждый год причиняемые ими разрушения обходятся в миллионы кредитов.




Гранитный слизень

Этот мелкий наземный моллюск при передвижении оставляет за собой след из кислотной слизи, вызывающей коррозию.

Дюракритовый червь

Наружные жабры могут втягиваться в рот.

Крупный (3–5 метров в длину), медленно движущийся червь-паразит. Обитает в нижних секциях зданий, прогрызая фундаменты и трубопроводы. Размножается путём партеногенеза.



Теневая прилипада

Это мелкое ракообразное прикрепляется к стенам зданий с помощью корневого щупальца, через которое поглощает питательные вещества. При опасности прячется в раковину.

когтистые лапы помогают передвигаться

Размножается, выпуская в воздух "яйца-зёрна" и "семя-пыльцу".

во рту имеются тёркоподобные зубы

втяжное корневое щупальце

Мышеястреб


Мышеястребы — хищные рептилии, которые летают, используя тёплые воздушные потоки, поднимающиеся из недр города. Считается единственным сохранившимся исконным видом Корусанта. Мышеястребы официально охраняются, так как питаются кремниевыми паразитами, причиняющими ущерб зданиям.

Видят в необычайно широком спектре, в том числе в ультрафиолетовом, инфракрасном и прочих диапазонах.

Тёмная серо-зелёная слизь гранитного слизня для мышееястреба выглядит ярко-жёлтой.

Перепонки на крыльях и хвосте помогают смахивать добычу с вертикальных поверхностей стен.

Задними конечностями подхватывает добычу.



Когда молодой мышееястреб достигает размеров взрослого, он укрывается где-нибудь в расщелине, его кожа лопается, и из неё выбирается взрослый мышееястреб. Он съедает старую кожу и улетает на поиски еды и пары.

Откладывают на карнизах и в жёлобах яйца, покрытые кожистой оболочкой. Вылупившиеся птенцы покрыты чешуёй и довольно уродливы, но полностью самостоятельны и уже способны охотиться.

Крыса-мутант

Гигантские (ростом до 3 метров, весом до 300 килограмм), практически-дыше, прожорливые грызуны, обитающие на нижних уровнях и в канализации. Происхождение неизвестно.

Крысы-мутанты держатся стаями и строят гнёзда, в которых выводят детёнышей (от 10 и больше в одном помёте).

Мощные зубы и челюсти могут превратить водопроводы и служебные коммуникации в хаос.

пасть покрыта язвами

шкура покрыта жировыми мешками и наростами

Эти крысы охотно пожирают дюракритовых червей — единственная польза, которую они приносят жителям Корусанта. В остальном их боятся и презирают.

Дианога

Эти огромные моллюски встречаются по всей Галактике. Часто используются для переработки сточных вод.

Предположительно происходят с планеты Водран. Предпочитают обитать в тёплой воде, но способны выживать и при резких перепадах температур, включая кипение. Невосприимчивы к загрязнениям.

глаз на стебельке

Вырастает до 20 метров в диаметре.

пасть находится в нижней части тела

бытовая проблема, которая может возникнуть при засорении канализации

Бездомные или скрывающиеся жители, спустившиеся на нижние уровни Корусанта, часто становятся жертвами бродячих стай крыс-мутантов или голодных дианог.


Дианоги — гермафродиты; откладывают большое количество желеобразных самооплодотворяющихся яиц. Дианоги могут пожирать всё подряд, живое и неживое, в том числе и собственные отложенные яйца.

Отрубленные щупальца отрастают вновь

Торговля животными На Корусанте, в этом бурлящем деловом центре Галактики, торговля животными процветает. Торговцы, посредники, ловцы и охотники привозят экземпляры живности со всех уголков вселенной местным дельцам, которые продают их зоопаркам или в качестве домашних любимцев и сельскохозяйственных животных. Некоторые из таких предприятий полностью легальны, другие абсолютно незаконны. Власти, как правило, закрывают на это глаза.



Стаи сбежавших, легко приспосабливающихся к новым условиям ануб, завезённых с Татуина, рыщут по переулкам Корусанта в поисках добычи.



Сбежавшие звери

Много экзотических видов животных, добытых на других планетах, контрабандой завозится горожанами для развлечения. К сожалеению, часто эти животные вырастают слишком опасными, чтобы с ними справиться, и их либо тайком выпускают, либо они сбегают сами (иногда предварительно пообедав своими хозяевами!). Жизнь живуча, и многие виды умудряются найти возможность существовать на воде.




Из маленьких нарглатчей получаются забавные питомцы, но, подрастая, они неизбежно становятся проблемой.



Сбежавшие вампы инстинктивно мигрировали в холодные полярные области Корусанта.

Нарглатч пожирает крысу-мутанта, одним глазом следя за загнанной в угол жертвой, предназначенной на десерт.



Пилозубые гранки, как и анубы, рыскают по нижним уровням Корусанта, питаясь отбросами и менее везучими существами...



...так же поступают и сбежавшие вирмоки.






Цирки, карнавалы и другие представления, демонстрирующие экзотические виды зверей со всей Галактики, бывают на Корусанте каждый год. Они пользуются огромной популярностью и для многих являются единственной возможностью увидеть редких животных.

Корусантская животноводческая выставка-ярмарка

Каждый год в загонах и залах Большого павильона проводится крупнейшая в Галактике животноводческая ярмарка — главное событие для всевозможных торговцев животными.

Множество сделок, как законных, так и не очень, заключается во время торгов, аукционов и царящей вокруг суеты. Животноводческая выставка предоставляет многим посетителям возможность побольше узнать друг о друге и о планетах, откуда они прибыли, глядя на зверей, которых они привозят с собой.

Иногда бывает непросто понять, где торговцы, а где их животные. Например, часто посетители пытаются "приобрести" эвоков, не разобравшись, что они и есть продавцы.



Это шумное, широко посещаемое мероприятие предоставляет много возможностей как для контрабанды, так и для побегов животных. Каждый год повсюду шныряют бесхозные нуны.

Не все животные способны прижиться на Корусанте. Альдераанская транта (доставленная с Беспина) не выживает в загрязнённом воздухе.

Сенаторы и их зверинцы

Будучи дипломатическим центром Галактики, Корусант является местом проживания множества дипломатов и послов, которые имеют здесь постоянные или временные резиденции. Эти дипломаты обыкновенно привозят с собой домашних питомцев со своих родных планет или приобретают таковых уже на Корусанте. Они держат их как напоминание о родине, а иногда преподносят кому-нибудь в дар.

Внимание к вопросам дикой природы и окружающей среды является предметом гражданской гордости и признаком статуса в дипломатических кругах



Корусантский голографический зоопарк вымерших и экзотических животных Альдераан

К сожалению, некоторых видов животных больше не существует из-за разрушения их природных условий, астрономических катаклизмов или естественного вымирания. Так произошло и с рядом биологических видов с планеты Альдераан, уничтоженной в результате варварских военных действий.

Транта Множество видов трант, величественных и грандиозных, обитало на Альдераане. Транты представляли собой рептилий, паривших в воздухе благодаря воздушным мешкам под кожей. Этих кротких гигантов использовали в качестве воздушного транспорта.

Питались воздушным зоопланктоном и мелкими летающими животными. Здесь представлены лишь некоторые виды.

обыкновенная, или
альдераанская
(беспинская) транта

гигантская транта

бллана-транта


пилотта-транта

Обыкновенная альдераанская транта сохранилась на Беспине, куда она была завезена много лет назад.

ДАННЫЕ РИСУНКИ ВЫПОЛНЕНЫ НА ОСНОВЕ
ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ ИЗ КОРУСАНТСКОГО ЗООПАРКА.

Другие исчезнувшие виды с Альдераана

Помимо обыкновенной транты, уцелели только два вида альдераанских животных, главным образом благодаря тому, что они распространены как домашний скот, — травоеды и нерфы.



домашний травоед

дикий травоед

Травоеды — смирные неторопливые травоядные животные, которых разводят на мясо и для других сельскохозяйственных нужд. С ними легко управляться, а вырастать они могут до огромных размеров.



нерф

Нерфы, также относящиеся к травоядным, отличаются поджарым телосложением и скверным характером. Имеют привычку плевать, когда раздражены. Самые нежные (и дорогие) стейки получаются с боков нерфа.

Среди других исчезнувших видов — шерстистый мотылёк (ниже приведено изображение взрослого мотылька и гусеницы), а также необычный вид рептилий, известный под названием «птицы-ходульщики». Эти нелетающие хищники вышагивали на двух ногах плотными группами, хватая клювами добычу, выпрыгивающую из травы.




шерстистый мотылёк



гусеница



Название этих изящных существ не сохранилось. Предположительно они питались насекомыми и нектаром.



птица-ходульщик

КОРУСАНТ

Новые поступления

Виды, которые впервые за всю историю представлены на Выставке, включают в себя следующие:

Исаламири


амфибии родом с планеты Миркр. Биоэлектрическая система этих животных блокирует их обнаружение при помощи Сиды. Используется для защиты от джедаев.



Дрох

миниатюрный, но смертоносный паразит с Нам-Хориоса.

Крайне быстро размножается и является причиной эпидемий, известной как "семя смерти".



Орбалиски

членистоногие паразиты, которые живут и размножаются на коже гуманоидов, образуя на ней броню.



орбалиск — вид снизу

энергетических пауках

Мало что известно об

с Кесселя, кроме того, что они обитают возле кожухов атомных батарей.



Татуинская джерба — малораспространённое выючное животное, разведением которого занимаются паситхины.

Неймодианская птица-пилат — красивая певчая птица, которую держат в клетках. Издаёт мелодичное, умиротворяющее пение. Отличается территориальным поведением.

Обитает в горах Неймодий.

Неймодианский николетун

забавного вида птица, которую также содержат в клетках. Издаёт гудящие крики.

Обитает в дождевых лесах Неймодий.



перепончатый гребень николетуна

Бурса

хищное животное родом с Гунганских болот. Питается крупными травоядными, в первую очередь моттами.

Бурс можно научить плясать на задних ногах.

Предприимчивые местные амаранцы начали отлавливать бурс и разводить их на экспорт.



Мамаша-паситхин заинтересовалась бурсой и размышляет, не купить ли животное, чтобы перепродать его хаттам.

торговец-амаранец

КОРУСАНТ

Алфавитный указатель

Айва, 128-129, 131
Аксиопитеро, 64
Альдераан, 168-171
Альдераанская (беспинская) транта, 128, 136, 165, 168
Амаранцы, 173
Ануба, 11, 17, 26-27, 29, 34, 38, 159

Балана-транта, 169
Банта, 7, 10-17, 41
Беддон, 134, 135
Беспин:
животный мир, 134-138, 168
общие сведения, 133
Бивнекот, 69, 70-73
Бларрг, 140
Бларт, 126-127
Болотная индейка, см. Нуна
Болотный слизень, 56-57
Болотокрыл, 61, 64, 65
Большой болотокрыл, 64
Большой крайт-дракон, 40-41
Бордок, 143
Боулам, 126
Бурса, 173

Вампа, 50-51, 160
Велкер, 135
Вирмок, 122-123, 125, 161
Водное чудовище сандо, 90-91, 119
Водный гандарк, 151
Водран, 157
Вомп-крыса, 28, 29, 31
Вуду, 19, 34
Вуламандра, 147, 148-149
Вурпак, 80-81

Галлипад, 100, 101, 126
Галумп, 24-25
Гандарк, 151
Гигантская транта, 168
Гигантский болотный слизень, 56-57
Гигантский космический слизень, 52-53



Гигантский таунтаун, 46, 48, 49
Горакс, 141
Горг, 31, 36, 37
Гофф-птица, см. Титавиан
Гранитный слизень, 154, 155
Гранк пилозубый, 117, 125, 160
Грейсор, 79
Гуалама, 73, 74-75, 76
Гуарлара, 76-77
Гунганские болота:
животный мир, 56, 94-131, 173
общие сведения, 93
Гунганский подводный транспорт (бонго), 90
Гунганы, 93, 96, 99, 101, 104, 107, 112, 118, 119, 127, 129, 131

Даггерт, 84, 85, 100, 121, 128
Дагоба:
дождевой лес в разрезе, 62-63
животный мир, 56-65
общие сведения, 55
Дагобский питон, 59
Датомир, 42
Датомирские ведьмы, 42, 43, 143
Дерево массасси, 147, 148
Джедай, 172
Джекреб, 28-29
Джерба, 172
Джиджо, 144
Джимву, 122, 124
Джубба-птица, 55, 61, 64, 65
Дианога, 157
Дракозмея, 58-59
Дрох, 172
Дюнная банта, 14, 15
Дюнное море (Татуин), 40
Дюракритовый червь, 154, 156

Жук-мясник, 60
Жук-пиранья, 147, 151

Залаака, 118-119, 124
Заманок, 144, 145
Земляной прыгун, 117

Ибиан, 30, 36
Икопи, 95
Иоб-краб, 108, 126
Иоб-креветка, 84, 108, 126
Исаламири, 172

Кааду, 99, 104-105, 118, 124, 131
Кабановолк, 140, 141
Каньонный крайт-дракон, 40
Карликовая банта, 14, 15
Карликовая нуна, 102, 103
Кессель, 172
Коло-когтерыба, 88-89, 90
Кондор-дракон, 142-143
Королевская гвардия Набу, 72
Корусант:
голографический зоопарк, 42, 168-171
животноводческая выставка-ярмарка, 164-165, 172
животный мир, 154-157
общие сведения, 153
сенаторы, 166-167
торговля животными, 158-161
цирки, 162-163
Космический слизень, 52-53
Крайт-дракон, 11, 40-41
Кремниевые паразиты, 154
Крита, 30, 36
Крыса-мутант, 156, 157, 160

Лаа, 84, 87
Лазаяющий таунтаун, 48
Ладия, 60
Ледниковый таунтаун, 48, 49
Ленивец светопятнистый, 60
Летуны, 136-137
Листохвост, 65
Лопатоголовая смука, 65

Майнок, 53
Мадый болотокрыл, 64, 65
Мародёры, 140, 143
Массасси, 147
Миркр, 172
Морп, 59
Морской убийца опи, 86-87, 88, 89, 90
Мотт, 96-97, 173




Мотылёк шерстистый, 171
Муудабок, 112-113
Мышеястреб, 155

Набу
Океанская бездна, 83-91
Гунганские болота, 92-131, 173
королева Набу, 75, 76, 81
общие сведения, 67
Тид и окрестности, 67-81
Нам-Хориос, 172
Нарглатч, 112, 118, 124-125, 160
Неймодианская птица-пилат, 173
Неймодианский николетун, 173
Неймодия, 173
Нерф, 170
Ниши экологические, 108-109
Нуна, 102-103, 164, 165
Нхарпира, 59
Ньорк, 94, 100, 111, 121, 126

Океанская бездна (Набу):
животный мир, 84-91
общие сведения, 83
Оллопом, 114, 121
Орбалиск, 172
Отга, 121

Паситхицы, 172, 173
Пеко-пеко, 98-99, 105
Пикоби, 100-101, 103
Пилозубый гранк, 117, 125, 160
Пилотта-транта, 168
Питон дагобский, 59
Пом, 114, 115
Пом-прыгун, 115, 121
Профогт, 29, 30-31
Птица-ходульщик, 171

Раввк, 136
Раггер, 145
Ранкор, 42-43, 123
Раньип, 147, 150, 151
Рей, 85
Розовая саламандра, 151



Ронто, 20-21, 26, 27
Рососпинник, 18-19, 34, 35

Сан-ламприс, 91
Сан-пайлот, 91
Сарлакк, 38-39, 41
Светопятнистый ленивец, 60
Семя смерти, 172
Си, 85, 87
Стинтария, 147, 149
Скетто, 11, 35
Скрендж, 58
Слизни:
гигантский болотный, 56-57
гигантский космический, 52-53
гранитный, 154, 155
Слизистая саламандра, см. Розовая саламандра
Суок-суоки, 37

Татуин:
животный мир, 10-43, 172
общие сведения, 9
Таунтаун лазающий, 48
Таунтаун ледниковый, 48, 49
Таунтаун обыкновенный (гигантский), 46, 48, 49
Таунтаун, 46-49, 50, 51
Твирилл, 75, 78, 79
Теневая прилипада, 154
Теразоа, 95, 108, 112
Ти, 84, 85, 89
Тид (Набу):
животный мир, 68-81
общие сведения, 67
Титавиан, 104, 130-131
Торговля животными, 158-161
Травоед, 170
Транты, 128, 136, 165, 168-169
Тук, 116, 121
Туколовка, 116-117
Тускены, 13, 16-17

Удильщик, 151
Узловатое дерево, 61
Узловатый белый паук, 61
Уоррт, 36
Урусай, 32-33, 39

Фаа, 85, 87
Файнаа, см. Фаа
Фалумпасет, 7, 94, 108-109
Фамбаа, 104, 106-107, 108-109

Хатты, 173
Хот:
Хот: животный мир, 46-53
Хот: общие сведения, 45
Хрумф, 110-111


Цирки, 162-163


Шаак, 68-69, 70, 71, 72, 165
Шаупот, 120
Шепчущая птица, 147, 149, 150, 151, 158
Шерстистый мотылёк, 171
Широ, 116-117
Шмыгун, 29, 31


Эвоки, 139, 140, 142-143, 165
Эвокский пони, 142-143
Эндор:
животный мир, 140-145
общие сведения, 139
Энергетический паук, 172
Эопи, 22-23, 26

Юззумы, 145

Явин-4:
животный мир, 148-151
общие сведения, 147







Вселенная "Звёздных войн" огромна и разнообразна, и населена множеством удивительных существ. Её увлекательный животный мир запечатлён в этом единственном в своём роде справочнике. Много лет всесторонних исследований и полевых наблюдений потребовалось, чтобы собрать эти записи, и на немалый риск пришлось пойти, чтобы изучить всех этих существ в их естественной среде обитания. Узнайте больше о брачных повадках, пищевом рационе, стадных инстинктах и защитных механизмах невероятных существ, населяющих ледяные поля Хота и пастбища Набу, бетонные джунгли Корусанта и раскалённые пески Татуина. Данный справочник — уникальная возможность получить всеобъемлющее представление о фауне "Звёздных войн".



www.starwars.com

www.chroniclebooks.com

ISBN 0-8118-2869-7 \$40.00 U.S.



9 0000

9 780811 828697